

大豆の大敵・イヌホオズキ類

— 良質大豆生産のためには防除が欠かせません —

こんな雑草が生えていませんか？



じゃがいもに似た白い花
(まれに淡紫色)

実は熟すと黒くなる
つぶれて汁が豆を汚す

イヌホオズキの仲間は鳥取県内では外来種を含む3~4種類が確認されています

花の比較



オオイヌ
ホオズキ

イヌホオ
ズキ

果実の比較



イヌホオ
ズキ

オオイヌ
ホオズキ

テリミノ
イヌホオ
ズキ

イヌホオズキ類の区別点と大豆バサグランの効果

	イヌホオズキ	オオイヌホオズキ	テリミノイヌホオズキ
花の色	白	白～淡紫	白～淡紫
花の切れ込み	浅い	深い	深い
果実の光沢	無い	有る	強い
果実の脱落	柄から離れる	しばしば柄ごと脱落	柄から離れる
果肉色（成熟時）	淡紫	緑	濃紫
種子の長さ	約2mm	1～1.3mm	約1.5mm
大豆バサグラン の効果	高い (まれに低いタイプもある)	低い (株によってばらつく)	様々 (低いタイプ、高いタイプがある)



イヌホオズキ類が発生しだしたら・・・

- 好条件で播種し、欠株が少なくして生育の良い大豆を作る
- 2種類以上の成分が入った土壌処理剤を散布する
- 大豆バサグラン液剤を散布する（効果が低いこともある）
- 必要に応じてバスタまたはハービー液剤の畦間処理、手取り除草を行う
- 機械をよく掃除し、未発生圃場への種子の持ち込みを防ぐ

有効な手段を組み合わせ、総合的な防除を行うことが重要です

大豆バサグラン液剤の使用基準

使用時期・回数：大豆の2葉期～開花前
(収穫45日前まで、1回)

使用量：100～150ml/10a（希釈水量100ℓ/10a）

(問い合わせ先)

作物研究室 研究員 福見尚哉

電話 0857-53-0721

本書から転載・複製する場合は、必ず鳥取県
農業試験場の許可を受けてください。