

Ⅱ 松くい虫被害対策事業に関する調査

1 目的

県内で実施されている当該事業に関し、防除適期の判定、防除効果の判定、被害発生に影響する気象条件など関連事項について調査・分析した。

2 方法

2.1 実施期間：昭和 52 年度～

2.2 担当者：西信介、池本省吾、谷口公教

2.3 材料と方法

2.3.1 防除適期の判定

平成 26 年 11～12 月に鳥取市気高町水尻地内等で当年夏～秋期に枯死したクロマツを丸太に玉切り、林業試験場構内（標高：30m、100m）と八頭町才代地内（標高：300m）の網室に搬入した。平成 27 年 5 月 25 日から 8 月 18 日まで供試丸太から羽化脱出したマツノマダラカミキリ成虫数を計数し、5%、50%、95%脱出日を算出して、松くい虫防除のための薬剤散布適期を判定した。

2.3.2 松くい虫防除効果調査

松くい虫被害防除事業の効果を確認するため、平成 27 年秋に固定調査地(鳥取市賀露、北栄町)において被害状況調査を行った。

3 結果

3.1 防除適期の判定

結果を表－1 に示す。平成 27 年度の空中散布実施日は第 1 回目が 6 月上旬、第 2 回目が 6 月中下旬であったため、マツノマダラカミキリ脱出の初期とピーク時のほぼ適期に実施できたと考える。

表－1 林業試験場構内と才代におけるマツノマダラカミキリの脱出日

羽化脱出状況	林業試験場		八頭町才代
	30m	100m	300m
5%脱出日	5 月 29 日	6 月 1 日	6 月 2 日
50%脱出日	6 月 13 日	6 月 17 日	6 月 18 日
95%脱出日	7 月 8 日	7 月 15 日	7 月 16 日

3.2 松くい虫防除効果調査

北栄町調査地では調査対象木 1,036 本(0.76ha、林齢 56 年)、鳥取市賀露調査地では調査対象木 475 本(1.00ha、林齢 61 年)を調査したが、松くい虫による枯死被害は確認できず、薬剤の予防散布によって被害が抑制されていると考えられた。