

10. 歯科疾患実態調査とアンケート調査結果との関連について

1) 歯みがき時間と歯肉の状況について (割合)

歯みがき時間が長い者ほど所見なし (コード0) の者が多くなっている。

男 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
1分以内	17.6	9.8	28.4	23.5	13.7	6.9
1～3分以内	19.1	10.4	32.5	25.4	11.1	1.5
3分以上	30.1	11.1	24.9	17.6	16.3	0.0
無回答	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3
総数	22.4	10.5	29.6	22.8	13.0	1.7

女 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
1分以内	19.9	16.2	23.5	20.6	11.0	8.8
1～3分以内	25.9	13.8	30.7	21.2	6.8	1.5
3分以上	28.8	14.0	22.1	24.8	10.4	0.0
無回答	20.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
総数	26.2	14.0	27.4	22.3	8.2	1.9

全 体

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
1分以内	18.9	13.4	25.6	21.8	12.2	8.0
1～3分以内	23.4	12.5	31.3	22.8	8.4	1.5
3分以上	29.3	12.8	23.2	22.0	12.7	0.0
無回答	25.0	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5
総数	24.8	12.7	28.2	22.5	10.1	1.8

2) 歯みがき時間と1人平均DMF歯数について

歯みがき時間が長い者ほど現在歯・健全歯が多く、喪失歯が少ない。

男 性

(単位：本)

	総数 (人数)	現在歯	健全歯	処置歯 (F)	未処置 (D)	喪失歯 (M)
1分以内	102	21.3	10.8	8.9	1.6	7.4
1～3分以内	539	26.7	15.2	10.3	1.2	2.3
3分以上	289	27.4	16.4	9.9	1.1	1.9
無回答	3	3.7	2.0	0.3	1.3	24.3
総数	933	26.3	15.1	10.0	1.2	2.8

女 性

(単位：本)

	総数 (人数)	現在歯	健全歯	処置歯 (F)	未処置 (D)	喪失歯 (M)
1分以内	136	21.4	10.5	9.8	1.1	7.3
1～3分以内	906	26.2	14.3	11.0	0.9	2.6
3分以上	444	26.9	14.7	11.2	0.9	2.0
無回答	5	16.0	8.2	7.8	0.0	12.2
総数	1,491	26.0	14.0	11.0	0.9	2.9

全 体

(単位：本)

	総数 (人数)	現在歯	健全歯	処置歯 (F)	未処置 (D)	喪失歯 (M)
1分以内	238	21.4	10.6	9.4	1.3	7.3
1～3分以内	1,445	26.4	14.6	10.8	1.0	2.5
3分以上	733	27.1	15.4	10.7	1.0	1.9
無回答	8	11.4	5.9	5.0	0.5	16.8
総数	2,424	26.1	14.4	10.6	1.0	2.9

※D：現在ある未処置歯

M：抜いた歯

F：治療した歯

3) 歯肉についての自覚症状がある人と、ない人の歯肉の状況について

自覚症状の無い者は所見なし（コード0）が最も多いが、コード3までは自覚症状の無い者が多い。自覚症状のある者は歯石沈着・歯肉炎（コード2・コード3・コード4）が多い。コード0でも自覚症状ありの者もいる。

男 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
自覚症状あり	16.7	9.5	24.3	29.0	19.5	1.0
自覚症状なし	24.1	10.8	31.1	21.0	11.1	1.9

女 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
自覚症状あり	22.1	15.0	28.2	24.7	9.4	0.5
自覚症状なし	27.7	13.7	27.0	21.4	7.8	2.4

全 体

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
自覚症状あり	20.2	13.1	26.9	26.2	12.9	0.7
自覚症状なし	26.2	12.5	28.7	21.3	9.1	2.2

4) かむ力と DMF 歯数について

何でもかめる者は現在歯・健全歯が多く、喪失歯が少ない。かみにくいものがある者・あまりかめない者になるにしたがって、現在歯・健全歯は少なくなり、喪失歯が多くなる。

男 性

(単位：本)

	総数（人数）	現在歯	健全歯	処置歯（F）	未処置（D）	喪失歯（M）
何でもかめる	708	27.5	16.7	9.9	1.0	1.6
あまりかめない	61	21.5	9.9	9.3	2.3	7.2
かみにくいものがある	155	22.5	9.7	10.8	2.0	6.4
無回答	9	23.7	12.9	10.4	0.3	5.6
合計	933	26.3	15.1	10.0	1.2	2.8

女 性

(単位：本)

	総数（人数）	現在歯	健全歯	処置歯（F）	未処置（D）	喪失歯（M）
何でもかめる	1,119	27.1	15.3	10.9	0.9	1.8
あまりかめない	74	19.9	8.4	10.1	1.5	8.7
かみにくいものがある	283	23.2	10.6	11.5	1.1	5.5
無回答	15	25.3	13.9	10.8	0.6	3.7
合計	1,491	26.0	14.0	11.0	0.9	2.9

全 体

(単位：本)

	総数（人数）	現在歯	健全歯	処置歯（F）	未処置（D）	喪失歯（M）
何でもかめる	1,827	27.2	15.8	10.5	0.9	1.7
あまりかめない	135	20.6	9.1	9.7	1.9	8.0
かみにくいものがある	438	22.9	10.3	11.2	1.4	5.8
無回答	24	24.7	13.5	10.7	0.5	4.4
合計	2,424	26.1	14.4	10.6	1.0	2.9

5) 喫煙と歯肉の状況について（割合）：20歳以上

たばこを吸わない者の方が所見なし（コード0）の者が多く、たばこを吸う者の方がコード2・コード3・コード4の所見を示すものが多い。

男 性

（単位：％）

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
たばこを吸う	14.5	10.0	31.1	29.0	13.3	2.1
たばこを吸わない	25.3	10.5	28.8	20.6	13.0	1.6
無回答	11.1	22.2	44.4	22.2	0.0	0.0
合計	22.4	10.5	29.6	22.8	13.0	1.7

女 性

（単位：％）

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
たばこを吸う	13.3	12.2	35.7	24.5	13.3	1.0
たばこを吸わない	27.2	14.1	26.9	22.1	7.9	1.8
無回答	16.7	16.7	16.7	25.0	8.3	16.7
合計	26.2	14.0	27.4	22.3	8.2	1.9

全 体

（単位：％）

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
たばこを吸う	14.2	10.6	32.4	27.7	13.3	1.8
たばこを吸わない	26.6	12.9	27.5	21.6	9.6	1.7
無回答	14.3	19.0	28.6	23.8	4.8	9.5
合計	24.8	12.7	28.2	22.5	10.1	1.8

6) 8020運動を知っているかと DMF 歯数について

8020運動を知っている者の方が知らない者より、現在歯・健全歯・処置歯が多く、未処置歯・喪失歯は少ない。

男 性

（単位：本）

	総数（人数）	現在歯	健全歯	処置歯（F）	未処置（D）	喪失歯（M）
知っている	373	26.6	15.4	10.2	0.9	2.5
知らない	551	26.1	14.8	9.8	1.4	3.0
無回答	9	24.6	14.2	10.0	0.3	4.7
合計	933	26.3	15.1	10.0	1.2	2.8

女 性

（単位：本）

	総数（人数）	現在歯	健全歯	処置歯（F）	未処置（D）	喪失歯（M）
知っている	830	26.7	14.2	11.7	0.8	2.1
知らない	648	25.1	13.9	10.1	1.1	3.7
無回答	13	20.5	10.7	8.8	1.1	8.5
合計	1,491	26.0	14.0	11.0	0.9	2.9

全 体

（単位：本）

	総数（人数）	現在歯	健全歯	処置歯（F）	未処置（D）	喪失歯（M）
知っている	1,203	26.7	14.6	11.2	0.8	2.3
知らない	1,199	25.6	14.3	10.0	1.3	3.4
無回答	22	22.2	12.1	9.3	0.8	6.9
合計	2,424	26.1	14.4	10.6	1.0	2.9

7) よくかむことを実践しているかと DMF 歯数について

あまり差を認めない。

男 性

(単位：本)

	総数 (人数)	現在歯	健全歯	処置歯 (F)	未処置 (D)	喪失歯 (M)
実践している	93	24.7	12.7	10.9	1.0	4.1
実践していない	831	26.4	15.3	9.9	1.3	2.7
無回答	9	24.9	13.4	11.1	0.3	4.7
合計	933	26.3	15.1	10.0	1.2	2.8

女 性

(単位：本)

	総数 (人数)	現在歯	健全歯	処置歯 (F)	未処置 (D)	喪失歯 (M)
実践している	178	25.3	13.5	10.8	1.0	3.7
実践していない	1,303	26.1	14.1	11.0	0.9	2.7
無回答	10	22.3	11.9	9.8	0.6	6.6
合計	1,491	26.0	14.0	11.0	0.9	2.9

全 体

(単位：本)

	総数 (人数)	現在歯	健全歯	処置歯 (F)	未処置 (D)	喪失歯 (M)
実践している	271	25.1	13.2	10.9	1.0	3.8
実践していない	2,134	26.2	14.6	10.6	1.1	2.7
無回答	19	23.5	12.6	10.4	0.5	5.7
合計	2,424	26.1	14.4	10.6	1.0	2.9

8) 歯ブラシ以外に何か使っているかと歯の本数について

補助的清掃用具を使用している者は使用していない者に比べて、50 歳代頃から現在歯数が多くなり、歳を重ねるにしたがいその差は顕著になる。

(単位：本)

年 代	デンタルフロス	歯間ブラシ	水流式口腔洗浄器	電動歯ブラシ	その他	使用していない	無回答
10 歳代	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0
20 歳代	29.1	29.2	27.8	29.4	29.2	29.2	0.0
30 歳代	28.6	28.3	28.3	28.9	29.2	28.9	29.0
40 歳代	28.3	28.1	28.1	28.5	27.9	28.2	28.0
50 歳代	27.2	26.1	27.8	26.7	25.6	25.8	25.7
60 歳代	25.5	24.2	20.9	23.3	20.5	21.2	17.8
70 歳代	19.4	20.9	22.0	23.2	14.1	17.2	11.0
80 歳以上	18.9	15.3	19.5	24.0	11.6	11.4	0.0
合 計	27.5	25.1	25.7	27.2	22.8	26.1	18.7

※健全歯、処置歯、未処置歯の平均本数

9) 定期的な歯科健診と歯の本数について

(単位：本)

定期的な歯科健診を受けている者とそうでない者の現在歯数の差は、受けている者の方が 60 歳代から多くなり始め、その差は歳を重ねるにしたがって顕著になる。

年 代	受けている	受けていない	無回答
10 歳代	28.0		28.0
20 歳代	28.9	29.3	29.3
30 歳代	28.8	28.6	28.9
40 歳代	28.2	28.0	28.6
50 歳代	26.1	26.2	26.5
60 歳代	23.6	21.7	22.1
70 歳代	19.2	16.4	19.0
80 歳以上	17.9	7.2	7.9
合 計	25.7	25.4	27.4

※健全歯、処置歯、未処置歯の平均本数