

IV アンケート調査結果の概要

1 歯みがきについて

1) 歯みがきの回数・時間について

すべての年代で1日2回歯をみがく者が多く、次いで3回以上のものが多い。2回以上みがく者が約80%を占めている。

〔1日何回歯をみがきますか〕

(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
毎日1回	11.1	10.7	8.3	10.6	10.6	12.6	14.0	13.6
毎日2回	49.2	52.3	54.3	51.9	48.1	44.6	44.2	45.0
毎日3回以上	36.7	33.4	34.6	34.3	39.2	41.2	39.5	35.6
時々みがく	2.3	2.9	2.6	2.6	2.2	1.4	1.6	3.1
みがかない	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0
無回答	0.5	0.6	0.3	0.3	0.0	0.3	0.8	1.6

前回調査との比較（無回答を除外して再計算）

鳥取H22

(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
毎日1回	16.2	10.5	8.0	15.3	19.3	17.1	24.8	30.0
毎日2回	42.8	41.7	45.1	39.5	43.9	46.8	39.7	35.8
毎日3回以上	38.5	45.7	46.5	43.0	34.8	33.0	31.1	24.2
時々みがく	1.9	1.6	0.4	1.9	1.1	2.0	3.3	7.5
みがかない	0.6	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	1.1	2.5

鳥取H28


(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
毎日1回	15.5	12.7	14.0	10.9	16.1	19.9	21.9	28.6
毎日2回	48.7	50.9	45.5	49.2	51.1	50.7	47.2	38.6
毎日3回以上	34.0	33.9	39.6	38.9	32.3	28.0	25.3	25.7
時々みがく	1.5	2.5	0.9	1.0	0.5	1.1	3.9	5.7
みがかない	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	1.4

鳥取R4

(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
毎日1回	11.2	10.8	8.3	10.7	10.6	12.6	14.1	13.8
毎日2回	49.5	52.6	54.4	52.1	48.1	44.7	44.5	45.7
毎日3回以上	36.9	33.7	34.7	34.4	39.2	41.3	39.8	36.2
時々みがく	2.3	2.9	2.6	2.6	2.2	1.4	1.6	3.2
みがかない	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1




歯みがき回数の比較

(単位：%)

	毎日1回	毎日2回	毎日3回以上	時々みがく	みがかない
鳥取(H22)	16.2	42.8	38.5	1.9	0.6
鳥取(H28)	15.5	48.7	34.0	1.5	0.2
鳥取(R4)	11.2	49.5	36.9	2.3	0.1

〔歯みがきの時間について〕

すべての年代で1～3分以内が一番多く、約半数を占める。



(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
1分以内	6.2	2.3	3.1	4.2	5.6	7.1	10.9	16.8
1～3分以内	57.4	54.2	54.0	58.2	59.4	67.3	57.0	49.7
3分以上	36.1	43.5	42.9	37.4	35.0	25.5	32.2	31.9
みがかない・無回答	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.6

前回調査との比較（みがかない・無回答を除外して再計算）

以前に比べ、1分以上みがく者の割合が減少し、3分以上みがく者の割合が増えている。

鳥取H22

(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
1分以内	13.8	6.2	7.3	7.9	13.8	19.7	24.0	33.6
1～3分以内	58.2	54.3	62.5	61.2	58.3	57.0	55.9	52.6
3分以上	28.0	39.5	30.2	30.8	27.9	23.3	20.1	13.8

鳥取H28


(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
1分以内	9.8	5.0	3.1	7.1	12.8	12.6	24.2	30.3
1～3分以内	59.8	56.1	63.2	62.6	61.1	61.4	48.9	44.7
3分以上	30.4	38.9	33.6	30.3	26.1	26.0	27.0	25.0

鳥取R4

(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
1分以内	6.2	2.3	3.1	4.2	5.6	7.1	10.9	17.0
1～3分以内	57.5	54.2	54.0	58.3	59.4	67.3	57.0	50.5
3分以上	36.2	43.5	42.9	37.5	35.0	25.5	32.2	32.4




歯みがき時間の前回調査との比較

(単位：%)

	1分以内	1～3分以内	3分以上
鳥取(H22)	13.8	58.2	28.0
鳥取(H28)	9.8	59.8	30.4
鳥取(R4)	6.2	57.6	36.2


〔いつ歯をみがきますか〕 複数回答



起床後

(単位：%)


	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男 性	36.5	39.7	36.6	39.9	34.8	32.0	35.1
女 性	35.5	24.7	31.7	33.3	31.5	38.7	40.2



朝食後

(単位：%)


	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男 性	52.6	57.1	54.1	56.5	62.1	64.1	63.5
女 性	69.1	82.3	76.2	75.0	75.9	76.8	63.2



昼食後

(単位：%)


	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男 性	21.2	19.6	14.8	26.8	32.6	28.2	31.1
女 性	51.3	50.0	53.5	55.2	45.1	41.9	40.2



夕食後

(単位：%)


	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男 性	26.9	20.1	15.8	23.2	32.6	47.6	54.1
女 性	27.6	25.3	26.7	25.0	35.2	51.6	46.2



寝る前

(単位：%)

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男 性	69.2	77.8	78.7	67.9	56.8	42.7	36.5
女 性	71.7	78.8	74.8	76.6	69.1	56.1	50.4




毎食後

(単位：%)

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男 性	7.1	5.3	3.3	8.9	14.4	21.4	20.3
女 性	15.8	14.6	17.3	14.6	20.4	25.2	26.5

〔普段、外出先や職場でも歯をみがきますか〕

毎日と時々がほぼ同じ割合で、60歳代までが合わせて50%であった。





(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
毎日	21.4	26.0	24.5	23.4	28.9	19.4	8.5	9.9
時々	24.9	30.2	26.4	24.9	22.8	26.5	20.2	21.0
みがかない・無回答	53.7	43.8	49.1	51.7	48.3	54.1	71.3	69.1

2) 歯科補助用具の使用について

約70%の者が補助清掃用具を使用している。若年者はフロス、高齢者は歯間ブラシを使用する傾向にある。



[歯ブラシ以外に何か使っていますか] 複数回答



(単位: %)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
デンタルフロス	33.9	32.8	45.7	40.8	38.3	27.9	22.1	15.2
歯間ブラシ	37.3	13.6	16.5	30.9	39.2	56.8	64.0	61.3
電動歯ブラシ	11.1	8.1	12.7	12.7	14.4	15.0	6.6	3.7
舌ブラシ	9.7	14.6	9.0	6.8	6.7	9.9	10.5	13.1
その他	1.7	1.3	2.3	1.8	1.9	0.3	1.9	2.6
使用していない	32.2	49.7	36.4	34.8	26.9	26.2	19.8	26.7
無回答	0.9	0.6	0.5	0.3	0.3	1.7	1.6	2.1

ワンタフト3、マウスウォッシュ3、洗口液2、デンタルリンス2、リステリン2、ハイドロクロス1、フロス(水)1、ヘッド極小ブラシ1、ポイントブラシ1、1本磨き用1、ジェットウォッシャー1、タフト1、タフトブラシ1、洗口薬1、夜デンタルフロス1、モンダミン1、ワンタフト歯ブラシ1、口腔洗浄器1、時々デンタルフロス、歯間ブラシ、舌ブラシ1、小さい歯ブラシ1、水圧ブラシ1、水流1

3) 歯ブラシの使い方について

全体的には約40%の者が歯みがき指導を受けており、若年者より60歳代以上でその割合が多い。



[歯ブラシの使い方を習ったことがありますか] 複数回答


(単位: %)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
歯科医院	39.6	27.9	31.3	36.9	39.7	47.6	53.1	50.3
保健センター	0.4	0.0	0.5	0.3	0.6	0.0	0.8	0.5
職場	0.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	0.7	0.6	0.0	0.8	0.6	0.0	1.9	2.1
指導なし	58.8	70.8	67.7	62.1	59.4	51.4	44.2	45.0
無回答	0.5	0.0	0.8	0.0	0.0	1.0	0.4	2.6

4) フッ化物洗口について

「フッ化物洗口」を知っていますか

知っている、あるいは聞いたことがある者が約50%である。現在行なっている者は約20%である。




「フッ化物洗口」を知っていますか (割合：無回答を除く) (単位：%)

	知っている	聞いたことはある	知らない
鳥取 (H22)	0.0	0.0	0.0
鳥取 (H28)	0.0	0.0	0.0
鳥取 (R4)	26.5	20.0	53.5

※ R4 調査からの新設項目

「フッ化物洗口」を行っていますか




「フッ化物洗口」を行っていますか (割合：無回答を除く) (単位：%)

	行っている	行っていない
鳥取 (H22)	0.0	0.0
鳥取 (H28)	0.0	0.0
鳥取 (R4)	20.9	79.1


※ R4 調査からの新設項目

2 自分自身の歯や歯ぐきの状態について

約75%の者が不満、不自由を感じている。この比率は前回調査とほぼ同様であった。



[現在のあなたの歯や歯肉の自覚症状について]




(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
食べ物が歯に挟まる	62.2	0.0	48.7	60.9	75.0	77.7	75.0	58.1
歯ぐきから血が出る	20.9	21.5	22.5	19.1	25.0	24.6	15.8	12.1
歯が痛む	22.0	24.0	22.8	26.4	18.4	22.8	22.3	12.9
歯並びなど外観	33.3	48.0	44.9	36.5	31.9	26.8	16.3	12.9
口臭がある	19.9	14.0	18.4	24.7	24.0	22.8	16.8	11.3
歯ぐきがはれる	18.2	13.5	14.2	15.7	16.0	29.0	23.9	19.4
不自由	7.3	2.5	2.2	6.0	5.9	11.6	15.2	15.3
入れ歯があわない	3.6	0.5	0.3	0.3	2.4	4.5	8.7	18.5
その他	7.7	9.0	11.7	6.7	7.6	7.6	6.0	0.8

3 歯の健康のために注意していることについて

かかりつけの歯科医を決めているか


年齢とともに、かかりつけの歯科医院を決めており特に女性にその傾向が強い。



かかりつけの歯科医院で定期的に歯科健診を受けていますか


(かかりつけの歯科医がある1790人の結果)

かかりつけの歯科医院を決めている者は、定期的に歯科健診を受ける割合が増加し、半数以上が定期健診を受けている。



定期的に歯石除去や歯面清掃を受けていますか


60歳代までは女性が定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者が多い。



4 高齢者歯科対策推進事業について

○「訪問歯科診療」を知っていますか

訪問歯科診療を38.6%が「知っている」・「聞いたことがある」と回答した。過去の調査とほぼ同様である。



「訪問歯科診療」を知っていますか (割合：無回答を除く) (単位：%)

	知っている	聞いたことはある	知らない
鳥取 (H22)	26.4	15.1	58.4
鳥取 (H28)	19.6	15.7	64.7
鳥取 (R4)	21.5	17.1	61.4


※無回答は割合から除く


5 あなたのかむ力について

年齢の上昇に合わせて「かみにくい」「あまりかめない」の割合は上昇している。50歳代と60歳代の差が最も大きく、50歳代では「何でもかめる」人の割合は8割あるが、60歳代では6割台となっている。

両方の奥歯でしっかりかめる人の割合も50歳代と60歳代で大きな差があった。

あごの関節に不調がある人の割合は20歳代から50歳代でやや多かったが、大きな差はない。






あごの関節の状態について (複数回答)

(単位: %)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
開閉口時に音がする	15.6	16.9	17.8	19.0	19.2	13.3	12.4	3.7
食事のときの痛み	1.6	1.3	1.8	1.8	0.0	1.7	1.9	3.7
口が開きにくい	4.7	5.8	4.7	5.7	5.6	4.8	3.5	0.5
特になし	78.8	78.6	77.3	75.6	77.2	80.3	80.6	87.4

6 喫煙について (20歳以上)

喫煙率は、多くの年代で15%程度であった。最も高かったのは40歳代である。



(単位: %)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
たばこを吸う	14.8	13.6	18.9	19.7	18.4	12.9	9.3	2.1
吸わない	84.0	85.1	80.3	79.5	80.8	85.7	89.1	95.3
無回答	1.2	1.3	0.8	0.8	0.8	1.4	1.6	2.6



平均喫煙期間

(単位: 年)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男性	22.9	5.4	15.2	23.9	30.1	37.8	47.2	50.0
女性	20.9	6.0	11.7	24.0	28.7	30.0	0.0	50.0
総数	22.6	5.5	14.9	23.9	29.8	37.5	47.2	50.0

○性別での比較

男性では30歳代での喫煙者割合が最も高く、女性では40歳代の喫煙者割合が最も高い。1日平均喫煙本数は男性で15本程度、女性で11本程度であった。



(男性)

(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
たばこを吸う	25.9	20.5	33.3	31.1	30.3	25.8	19.4	4.1
吸わない	73.1	79.5	65.1	68.9	68.5	72.7	78.7	94.6
無回答	1.0	0.0	1.6	0.0	1.2	1.5	1.9	1.3

(女性)

(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
たばこを吸う	5.3	6.6	5.1	9.4	7.8	2.5	2.6	0.9
吸わない	93.3	90.8	94.9	89.1	91.7	96.3	96.1	95.7
無回答	1.4	2.6	0.0	1.5	0.5	1.2	1.3	3.4

1日あたり平均喫煙本数

(単位：本)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男性	15.1	12.2	13.6	15.8	17.0	17.5	15.2	7.3
女性	11.3	10.0	8.2	13.0	12.9	11.3	9.0	3.0
総数	14.4	11.8	12.9	15.1	16.0	16.7	14.6	6.3


平均喫煙期間

(単位：年)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
男性	22.9	5.4	15.2	23.9	30.1	37.8	47.2	50.0
女性	20.9	6.0	11.7	24.0	28.7	30.0	0.0	50.0
総数	22.6	5.5	14.9	23.9	29.8	37.5	47.2	50.0

7 8020運動について

約5割が8020運動を認知しているが、20歳代では3割程度であった。




(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
知っている	50.3	33.8	45.0	55.1	57.8	62.6	48.5	47.6
知らない	48.6	64.9	54.3	44.1	41.1	36.4	49.6	50.8
無回答	1.1	1.3	0.7	0.8	1.1	1.0	1.9	1.6

8 なかなか歯科医院に行けないことがありますか。(仕事が忙しく休めない)

30歳代、40歳代は約50%が行けないと答えた。




(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
はい	34.0	37.0	51.7	49.1	37.5	20.1	9.3	11.0
いいえ	64.6	61.7	47.3	50.4	61.4	78.2	88.0	86.4
無回答	1.4	1.3	1.0	0.5	1.1	1.7	2.7	2.6

9 全身の状態について


40歳代以降で増加を認め、70歳代で半数以上に全身疾患が認められた。



(単位：%)

	総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
糖尿病	6.0	0.3	0.8	1.3	6.5	10.7	13.3	14.0
関節リウマチ	1.2	0.0	0.3	0.3	1.4	2.7	2.2	2.7
狭心症・心筋梗塞・ 脳梗塞	2.4	0.0	0.5	0.5	1.1	2.7	6.3	9.0
内臓型肥満	5.6	1.0	2.7	5.8	8.5	9.4	7.8	4.5
妊 娠	0.8	4.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨粗しょう症	3.7	0.0	0.0	0.5	1.1	4.3	10.3	14.8
特になし	71.1	93.3	91.7	86.5	73.7	55.2	42.4	32.9
その他	9.2	1.4	2.4	5.1	7.7	15.0	17.7	22.1

○性別での比較



(単位：%)

	総数		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳代		80歳以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
糖尿病	7.3	4.9	0.0	0.7	1.6	0.0	2.2	0.5	10.5	3.1	11.8	9.8	17.1	10.8	17.9	11.6
関節リウマチ	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.6	2.1	2.9	2.5	1.9	2.4	3.6	2.2
狭心症・心筋梗塞・脳梗塞	3.2	1.8	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.9	0.5	3.7	1.8	9.5	4.2	11.9	7.2
内臓型肥満	6.9	4.6	1.3	0.7	3.3	2.1	6.6	5.2	12.3	5.2	11.0	8.0	9.5	6.6	4.8	4.3
骨粗しょう症	0.9	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.1	0.7	7.4	3.8	14.5	4.8	21.0
特になし	73.5	69.1	98.0	88.4	91.8	91.7	85.8	87.1	67.9	78.5	57.4	53.4	43.8	41.6	36.9	30.4
その他	7.3	10.7	0.7	2.0	2.2	2.6	4.4	5.7	6.8	8.4	12.5	17.2	14.3	19.9	20.2	23.2
妊 娠		1.5		8.2		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

10 歯科疾患実態調査とアンケート調査結果との関連について

1) 歯みがき回数と歯肉の状況について

歯みがき回数と歯肉の状況について相関関係はなかった。

男 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
1 回	11.9	13.6	23.9	32.4	17.1	1.1
2 回	23.8	11.5	20.7	27.5	15.8	0.7
3 回	17.3	13.1	15.6	32.9	20.7	0.4
時々	10.0	12.5	15.0	37.5	25.0	0.0
無回答	20.0	20.0	0.0	20.0	40.0	0.0
総 数	19.7	12.3	19.7	30.0	17.6	0.7

女 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
1 回	11.9	22.4	9.0	32.8	19.4	4.5
2 回	18.9	12.9	15.3	34.6	16.8	1.5
3 回	22.7	14.0	15.1	32.6	14.4	1.2
時々	18.2	9.1	27.3	36.3	9.1	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	0.0
総 数	20.2	13.9	15.0	33.6	15.8	1.5

全 体

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
1 回	11.9	16.0	19.8	32.5	17.7	2.1
2 回	21.4	12.2	18.0	31.0	16.3	1.1
3 回	21.1	13.8	15.2	32.7	16.2	1.0
時々	11.8	11.8	17.6	37.2	21.6	0.0
無回答	10.0	10.0	0.0	40.0	40.0	0.0
総 数	20.0	13.2	17.1	31.9	16.6	1.2

2) 歯みがき回数とDMF歯数について

歯みがき回数が2回以上の者は、喪失歯数が少なかった。

男 性

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
1 回	176	25.6	14.1	9.9	1.7	3.4
2 回	546	26.7	16.1	9.6	1.0	2.2
3 回	237	25.6	13.1	11.6	0.9	3.1
時々	40	24.8	12.2	10.1	2.6	3.6
無回答	5	24.8	17.6	6.4	0.8	3.8
総 数	1,005	26.2	14.9	10.1	1.1	2.7

女 性

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
1 回	67	22.9	10.8	11.1	1.0	5.6
2 回	529	25.4	12.2	12.2	1.0	3.2
3 回	564	25.8	13.3	11.8	0.6	2.8
時々	11	24.3	11.3	10.1	2.9	4.9
無回答	5	26.0	10.0	14.8	1.2	3.2
総 数	1,178	25.4	12.6	12.0	0.8	3.2

全 体

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
1 回	243	24.9	13.2	10.2	1.5	4.0
2 回	1,075	26.1	14.2	10.9	1.0	2.7
3 回	801	25.7	13.3	11.7	0.7	2.9
時々	51	24.7	12.0	10.1	2.6	3.9
無回答	10	25.4	13.8	10.6	1.0	3.5
総 数	2,183	25.8	13.7	11.1	1.0	2.9

※D：現在ある未処置歯 M：抜いた歯 F：治療した歯

3) 歯みがきのタイミングとDMF歯数について

寝る前に歯みがきをしている人が喪失歯が少ない。

男 性

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
朝起きた時	371	26.0	14.8	10.1	1.1	2.8
朝食後	579	26.2	14.8	10.4	1.0	2.6
昼食後	237	25.6	13.2	11.5	0.9	3.1
夕食後	280	24.6	13.5	10.4	0.7	4.0
寝る前	659	27.0	15.7	10.0	1.3	1.9
無回答	1	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0
総 数	1,005	26.2	14.9	10.1	1.1	2.7

女 性

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
朝起きた時	389	24.5	11.9	11.7	0.9	4.0
朝食後	882	25.8	12.7	12.3	0.8	2.8
昼食後	576	25.8	13.5	11.7	0.6	2.8
夕食後	385	24.6	11.5	12.3	0.7	4.0
寝る前	821	25.8	13.2	11.8	0.8	2.8
無回答	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
総 数	1,178	25.4	12.6	12.0	0.8	3.2

全 体

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
朝起きた時	760	25.3	13.3	10.9	1.0	3.4
朝食後	1,461	26.0	13.6	11.5	0.9	2.7
昼食後	813	25.8	13.4	11.6	0.7	2.9
夕食後	665	24.6	12.3	11.5	0.7	4.0
寝る前	1,480	26.3	14.3	11.0	1.0	2.4
無回答	1	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0
総 数	2,183	25.8	13.7	11.1	1.0	2.9

※D：現在ある未処置歯 M：抜いた歯 F：治療した歯

4) 補助用具と歯肉の状況について

補助用具と歯肉の状況について相関関係は認められない。

20歳代

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4
デンタルフロス	33.7	24.7	15.8	22.8	3.0
歯間ブラシ	31.0	11.9	26.2	23.8	7.1
電動歯ブラシ	32.0	24.0	20.0	24.0	0.0
舌ブラシ	37.8	13.3	28.9	20.0	0.0
使用していない	29.0	19.7	32.2	13.8	5.3

30歳代

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4
デンタルフロス	34.5	20.9	17.5	22.0	5.1
歯間ブラシ	21.9	17.2	20.3	31.2	9.4
電動歯ブラシ	30.6	20.4	22.5	20.4	6.1
舌ブラシ	42.9	31.4	8.6	14.3	2.8
使用していない	29.8	15.6	23.4	27.0	4.2

40歳代

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4
デンタルフロス	22.4	12.2	14.1	34.6	16.7
歯間ブラシ	22.7	8.4	14.3	38.6	16.0
電動歯ブラシ	18.4	8.2	16.3	40.8	16.3
舌ブラシ	26.9	19.2	7.7	42.3	3.9
使用していない	24.6	11.9	27.6	26.9	9.0

50歳代

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4
デンタルフロス	21.7	14.5	12.3	31.9	19.6
歯間ブラシ	14.2	9.2	16.3	34.1	26.2
電動歯ブラシ	21.1	13.5	19.2	32.7	13.5
舌ブラシ	12.5	16.7	8.3	54.2	8.3
使用していない	17.5	12.4	23.7	27.8	18.6

60歳代

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4
デンタルフロス	8.5	11.0	9.7	41.5	29.3
歯間ブラシ	13.3	6.0	11.4	39.2	30.1
電動歯ブラシ	11.4	4.5	11.4	43.2	29.5
舌ブラシ	21.4	3.6	14.3	39.3	21.4
使用していない	10.4	16.9	14.3	38.9	19.5

70歳代

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4
デンタルフロス	8.8	5.3	12.3	52.6	21.0
歯間ブラシ	7.9	7.3	9.7	41.8	33.3
電動歯ブラシ	12.5	6.3	6.3	50.0	25.0
舌ブラシ	11.5	15.4	11.5	42.3	19.3
使用していない	8.5	2.1	12.8	46.8	29.8

80歳代

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4
デンタルフロス	0.0	10.4	3.4	51.7	34.5
歯間ブラシ	3.6	9.0	9.0	46.0	32.4
電動歯ブラシ	20.0	20.0	40.0	0.0	20.0
舌ブラシ	13.6	13.6	13.6	31.9	27.3
使用していない	4.4	11.1	8.9	44.4	31.1

5) 歯肉についての自覚症状がある人と、ない人の歯肉の状況について

男女ともに症状はコード3が最も高く、いずれのコードでも自覚症状はあるがコード3以上でより高くなる。

男 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
自覚症状あり	14.5	10.9	20.6	30.6	23.4	0.0
自覚症状なし	21.4	12.8	19.4	29.8	15.7	0.9

女 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
自覚症状あり	14.2	12.5	16.7	34.5	21.7	0.4
自覚症状なし	22.1	14.4	14.4	33.3	13.9	1.9

全 体

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
自覚症状あり	14.4	11.7	18.5	32.7	22.5	0.2
自覚症状なし	21.8	13.6	16.7	31.7	14.7	1.5

6) 過去1年間に歯科検診を受けたかと歯の本数について

20歳代～30歳代は差はないが、60歳代以降に差を認める。

(単位：本)

	受けている		受けていない		無 回 答	
	残存歯数	喪失歯	残存歯数	喪失歯	残存歯数	喪失歯
20歳代	28.7	0.2	28.7	0.2	0.0	0.0
30歳代	28.5	0.3	28.5	0.4	29.5	0.5
40歳代	28.1	0.7	27.6	1.1	29.0	0.0
50歳代	26.5	2.1	27.1	1.7	20.5	7.5
60歳代	24.2	4.4	23.5	5.0	24.5	3.5
70歳代	21.4	6.9	19.0	9.2	12.5	16.0
80歳以上	18.7	9.8	16.1	12.1	7.0	21.0
合 計	25.2	3.4	25.5	3.2	22.4	6.4

※健全歯、処置歯、未処置歯の平均本数と喪失歯の平均本数

7) 定期的な歯科検診と満足感（自覚症状）

定期的に歯科検診を受けている者のほうが満足度が高い。

男 性

(単位：%)

	満足している	やや不満	不自由	無回答
受けている	29.8	62.0	8.2	0.0
受けていない	18.2	71.0	10.1	0.7
無回答	0.0	66.7	33.3	0.0
合 計	25.3	65.4	9.0	0.3

女 性

(単位：%)

	満足している	やや不満	不自由	無回答
受けている	27.0	64.2	8.8	0.0
受けていない	23.9	63.4	12.7	0.0
無回答	11.1	88.9	0.0	0.0
合 計	25.8	64.2	10.0	0.0

全 体

(単位：%)

	満足している	やや不満	不自由	無回答
受けている	28.2	63.3	8.5	0.0
受けていない	21.4	66.8	11.5	0.3
無回答	8.3	83.4	8.3	0.0
合 計	25.6	64.7	9.6	0.1

8) 定期的な歯石除去・歯面清掃と歯肉の状況について

コード3以上の者は定期的な歯石除去・歯面清掃を受けている。

受けている

(単位：%)

年 代	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象菌なし
20歳代	29.8	26.9	17.3	22.1	2.9	1.0
30歳代	29.8	25.3	15.8	25.9	3.2	0.0
40歳代	17.5	13.1	16.9	36.1	16.4	0.0
50歳代	18.5	13.3	12.7	35.3	20.2	0.0
60歳代	13.9	6.0	9.6	46.4	23.5	0.6
70歳代	9.6	7.2	8.4	42.5	31.7	0.6
80歳以上	4.8	6.6	4.8	45.7	30.5	7.6
合 計	17.6	13.6	12.4	36.7	18.7	1.0

受けていない

(単位：%)

年 代	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象菌なし
20歳代	33.0	15.0	29.5	17.5	5.0	0.0
30歳代	31.5	13.8	22.7	24.4	7.6	0.0
40歳代	28.0	10.0	21.5	31.0	9.0	0.5
50歳代	19.7	11.5	22.4	27.8	18.6	0.0
60歳代	10.6	16.3	17.9	26.8	28.4	0.0
70歳代	4.8	8.4	13.3	42.2	26.5	4.8
80歳以上	1.2	12.5	13.8	33.8	27.5	11.2
合 計	22.6	12.7	21.8	27.2	14.4	1.3

9) 定期的な歯石除去・歯面清掃と歯の本数について

60歳代以上では、定期的に歯石除去・歯面清掃を受けている者は、受けていない者に比べて残存歯数が多く喪失歯が少ない。

(単位：本)

	受けている		受けていない		無回答	
	残存歯数	喪失歯	残存歯数	喪失歯	残存歯数	喪失歯
20歳代	28.6	0.2	28.9	0.1	28.3	0.3
30歳代	28.6	0.3	28.8	0.3	28.3	2.0
40歳代	28.0	0.8	28.2	0.7	26.0	3.0
50歳代	26.8	1.8	26.9	1.9	26.5	2.5
60歳代	24.4	4.1	23.3	5.1	26.4	3.0
70歳代	22.1	6.2	18.4	9.9	19.6	8.8
80歳以上	19.4	9.1	15.7	12.6	18.7	9.5
合計	25.6	3.0	26.0	2.8	23.8	5.1

※健全歯、処置歯、未処置歯の平均本数と喪失歯の平均本数

10) かむ力とDMF歯数について

何でもかめると回答した者は、現在歯数、健全歯数が多く、あまりかめないとは喪失歯が多い。

男性

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
何でもかめる	813	27.3	16.3	9.9	1.0	1.6
あまりかめない	38	18.3	6.9	8.2	3.2	10.3
かみにくいものがある	145	21.9	8.9	11.8	1.2	6.6
無回答	9	25.3	17.1	6.3	1.9	3.4
合計	1,005	26.2	14.9	10.1	1.1	2.7

女性

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
何でもかめる	941	26.5	13.8	11.9	0.7	2.2
あまりかめない	33	21.5	9.2	11.0	1.3	6.9
かみにくいものがある	192	20.9	7.4	12.2	1.3	7.4
無回答	12	26.8	14.1	11.9	0.8	2.3
合計	1,178	25.4	12.6	12.0	0.8	3.2

全体

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
何でもかめる	1,754	26.9	15.0	11.0	0.9	1.9
あまりかめない	71	19.8	8.0	9.5	2.3	8.7
かみにくいものがある	337	21.4	8.0	12.1	1.3	7.1
無回答	21	26.2	15.4	9.5	1.3	2.8
合計	2,183	25.8	13.7	11.1	1.0	2.9

※D：現在ある未処置歯 M：抜いた歯 F：治療した歯

11) 咀嚼とかかりつけ医と補綴の状況について

左右両方、もしくは片方かみしめられる者は補綴完了者が多かった。補綴完了者にも両方かみしめられない者が多くみられた。かかりつけ歯科医を決めている者の方が、補綴完了者が多く、未完了者が少ない。

また左右両方もしくは、片方かみしめられるものが多い。かかりつけ歯科医を決めていない者は、補綴未完了者が多く、かみしめられない傾向にあった。

かかりつけ医を決めている

男 性

(単位：%)

	補綴完了者	一部完了者	未完了者	対象歯なし
左右両方かみしめられる	26.5	7.5	11.3	54.7
片 方	34.4	24.0	17.6	24.0
両方かみしめられない	43.5	28.2	19.6	8.7
無回答	40.0	0.0	40.0	20.0
合 計	29.3	12.1	13.2	45.4

女 性

(単位：%)

	補綴完了者	一部完了者	未完了者	対象歯なし
左右両方かみしめられる	28.1	9.4	10.1	52.4
片 方	37.2	21.1	16.6	25.1
両方かみしめられない	41.7	30.0	18.3	10.0
無回答	55.6	22.2	22.2	0.0
合 計	31.1	13.2	12.1	43.6

全 体

(単位：%)

	補綴完了者	一部完了者	未完了者	対象歯なし
左右両方かみしめられる	27.4	8.6	10.6	53.4
片 方	36.1	22.3	17.0	24.6
両方かみしめられない	42.5	29.2	18.9	9.4
無回答	50.0	14.3	28.6	7.1
合 計	30.3	12.7	12.6	44.4

かかりつけ医を決めていない

男 性

(単位：%)

	補綴完了者	一部完了者	未完了者	対象歯なし
左右両方かみしめられる	5.6	4.1	6.6	83.7
片 方	22.9	11.4	11.4	54.3
両方かみしめられない	12.5	12.5	37.5	37.5
無回答	0.0	50.0	0.0	50.0
合 計	8.3	5.8	8.3	77.6

女 性

(単位：%)

	補綴完了者	一部完了者	未完了者	対象歯なし
左右両方かみしめられる	4.8	3.8	5.7	85.7
片 方	18.2	4.5	9.1	68.2
両方かみしめられない	0.0	0.0	33.3	66.7
無回答	0.0	0.0	100	0.0
合 計	6.9	3.8	7.6	81.7

全 体

(単位：%)

	補綴完了者	一部完了者	未完了者	対象歯なし
左右両方かみしめられる	5.3	4.0	6.3	84.4
片 方	21.1	8.8	10.5	59.6
両方かみしめられない	9.1	9.1	36.4	45.4
無回答	0.0	33.3	33.3	33.3
合 計	7.8	5.1	8.1	79.0

12) 喫煙と歯肉の状況について (割合) : 20歳以上

タバコを吸う者がタバコを吸わない者よりも、コード3以上の者が多く、タバコを吸う者の中でコード3以上は男性では50%以上、女性では60%以上である。

男 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
たばこを吸う	15.0	10.8	26.1	28.5	19.2	0.4
たばこを吸わない	21.4	12.9	17.4	30.8	16.7	0.8
無回答	20.0	10.0	20.0	10.0	40.0	0.0
合 計	19.7	12.3	19.7	30.0	17.6	0.7

女 性

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
たばこを吸う	12.7	11.1	12.7	39.7	23.8	0.0
たばこを吸わない	20.8	13.8	15.2	33.1	15.5	1.6
無回答	12.5	31.2	6.3	43.7	6.3	0.0
合 計	20.2	13.9	15.0	33.6	15.8	1.5

全 体

(単位：%)

	コード0	コード1	コード2	コード3	コード4	対象歯なし
たばこを吸う	14.6	10.8	23.5	30.7	20.1	0.3
たばこを吸わない	21.0	13.4	16.1	32.2	16.0	1.3
無回答	15.4	23.1	11.5	30.8	19.2	0.0
合 計	20.0	13.2	17.1	31.9	16.6	1.2

13) 8020運動を知っているかとDMF歯数について

8020運動を知っている者と知らない者では、現在歯、健全歯、DMF歯数について差は認められない。

男 性

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
知っている	410	26.1	14.3	11.0	0.9	2.6
知らない	584	26.2	15.3	9.6	1.3	2.7
無回答	11	25.8	15.9	8.3	1.6	3.0
合 計	1,005	26.2	14.9	10.1	1.1	2.7

女 性

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
知っている	688	25.6	12.5	12.5	0.7	2.9
知らない	476	25.1	12.8	11.2	1.1	3.5
無回答	14	27.1	13.9	12.2	0.9	1.9
合 計	1,178	25.4	12.6	12.0	0.8	3.2

全 体

(単位：本)

	総数(人数)	現在歯	健全歯	処置歯(F)	未処置(D)	喪失歯(M)
知っている	1,098	25.8	13.1	11.9	0.8	2.8
知らない	1,060	25.7	14.2	10.3	1.2	3.1
無回答	25	26.5	14.8	10.5	1.2	2.4
合 計	2,183	25.8	13.7	11.1	1.0	2.9

※ D：現在ある未処置歯 M：抜いた歯 F：治療した歯

14) 全身の状態とかむ力の関連性

かみにくいものがあると答えた者は、全身疾患を有しない者に比べ、顎関節に症状がでる関節リウマチで3倍、糖尿病、心疾患でも2～3倍であった。

糖尿病

(単位：%)

	なんでもかめる	あまりかめない	かみにくいものがある
男 性	71.2	6.9	21.9
女 性	72.4	1.7	25.9
全 体	71.7	4.6	23.7

関節リウマチ

(単位：%)

	なんでもかめる	あまりかめない	かみにくいものがある
男 性	60.0	10.0	30.0
女 性	58.8	0.0	41.2
全 体	59.3	3.7	37.0

狭心症・心筋梗塞・脳梗塞

(単位：%)

	なんでもかめる	あまりかめない	かみにくいものがある
男 性	59.4	3.1	37.5
女 性	71.4	0.0	28.6
全 体	64.1	1.9	34.0

内蔵型肥満

(単位：%)

	なんでもかめる	あまりかめない	かみにくいものがある
男 性	78.3	4.3	17.4
女 性	63.6	3.7	32.7
全 体	71.8	4.0	24.2

妊 娠

(単位：%)

	なんでもかめる	あまりかめない	かみにくいものがある
男 性	0.0	0.0	0.0
女 性	100	0.0	0.0
全 体	100	0.0	0.0

骨粗しょう症

(単位：%)

	なんでもかめる	あまりかめない	かみにくいものがある
男 性	55.6	0.0	44.4
女 性	64.8	4.2	31.0
全 体	63.7	3.8	32.5

特になし

(単位：%)

	なんでもかめる	あまりかめない	かみにくいものがある
男 性	85.1	2.8	12.1
女 性	84.7	1.9	13.4
全 体	84.9	2.4	12.7

15) 奥歯でしっかりかみしめられるかと全身の状態について

全身疾患を有しない者に比べ、糖尿病、心疾患を有する者では両方かみしめられない者の割合が2～3倍、関節リウマチを有する者ではあまりかみしめられないが3倍であった。

糖尿病

(単位：%)

	左右両方かみしめられる	あまりかめない	両方かみしめられない
男 性	63.4	22.5	14.1
女 性	63.1	28.1	8.8
全 体	63.3	25.0	11.7

関節リウマチ

(単位：%)

	左右両方かみしめられる	あまりかめない	両方かみしめられない
男 性	50.0	40.0	10.0
女 性	47.1	47.1	5.8
全 体	48.2	44.4	7.4

狭心症・心筋梗塞・脳梗塞

(単位：%)

	左右両方かみしめられる	あまりかめない	両方かみしめられない
男 性	65.6	18.8	15.6
女 性	63.2	26.3	10.5
全 体	64.7	21.6	13.7

内蔵型肥満

(単位：%)

	左右両方かみしめられる	あまりかめない	両方かみしめられない
男 性	66.7	24.6	8.7
女 性	59.3	37.0	3.7
全 体	63.4	30.1	6.5

妊 娠

(単位：%)

	左右両方かみしめられる	あまりかめない	両方かみしめられない
男 性	0.0	0.0	0.0
女 性	88.9	11.1	0.0
全 体	88.9	11.1	0.0

骨粗しょう症

(単位：%)

	左右両方かみしめられる	あまりかめない	両方かみしめられない
男 性	55.6	44.4	0.0
女 性	67.1	24.3	8.6
全 体	65.8	26.6	7.6

特になし

(単位：%)

	左右両方かみしめられる	あまりかめない	両方かみしめられない
男 性	79.0	16.9	4.1
女 性	76.2	18.9	4.9
全 体	77.5	18.0	4.5

16) 妊娠中と回答した者における歯科疾患有病率

妊娠中はむし歯を有する者の割合が高い。

女 性

(単位：%)

	むし歯あり	むし歯なし	歯周病あり	歯周病なし
妊 娠	94.4	5.6	33.3	66.7

参 考

数値等の算出法について

本調査の結果に示した主な数値等は次の方法により算出した

1. う蝕有病者率

$$1) \text{う蝕有病者率 (\%)} = \frac{\text{う蝕のある者の数}}{\text{被調査者数}} \times 100$$

(注)う蝕のある者の数：未処置歯、処置歯のいずれかを1本以上有するものの数

2. 1人平均現在歯数

$$1) \text{1人平均現在歯数 (本)} = \frac{\text{現在歯数}}{\text{被調査者数}}$$

(注)現在歯数：健全歯、未処置歯、処置歯の総数

被調査者数：前記1 1)に同じ

3. 1人平均う蝕経験歯数 (DMF)

$$1) \text{DMFT (歯)} = \frac{\text{未処置歯} + \text{処置歯} + \text{喪失歯の総数}}{\text{被調査者数}}$$

(注)被調査者数：前記1 1)に同じ

4. 喪失歯所有者率および1人平均喪失歯数

$$1) \text{喪失歯所有者率 (\%)} = \frac{\text{喪失歯のある者の数}}{\text{被調査者数}} \times 100$$

(注)喪失歯のある者の数：喪失歯を1本以上有する者の数

被調査者数：前記1 1)に同じ

$$2) \text{1人平均喪失歯数 (本)} = \frac{\text{喪失歯数}}{\text{被調査者数}}$$

(注)喪失歯数：前項3 1)に同じ

被調査者数：前記1 1)に同じ

5. 歯肉の有所見者率

$$1) \text{歯肉の有所見者率 (\%)} = \frac{\text{歯肉に所見のある者の数}}{\text{被調査者数}} \times 100$$

(注)被調査者数：前記1 1)に同じ

6. う蝕処置完了者率

$$1) \text{う蝕処置完了者率 (\%)} = \frac{\text{処置完了者数}}{\text{う蝕のある者の数}} \times 100$$

おわりに

平成7年度から5年ごとを目安に県民歯科疾患実態調査を実施し、歯科健診とアンケート調査を行い、県民の歯科疾患の現状と生活習慣を把握し、歯科保健対策を推進する基礎資料としてきました。平成25年12月には本調査を資料として県民の歯と口腔の健康づくりに関する基本的施策を定め、総合的かつ計画的に歯科保健対策を推進することにより、歯科疾患の有病率の低下を図り、県民の生涯にわたる健康の保持増進を目的として「鳥取県歯と口腔の健康づくり推進条例」が制定されました。今回は制定後2回目の実態調査となり、新型コロナウイルス感染症拡大下において実施されました。

《調査結果から見たこと》

2大歯科疾患であるむし歯と歯周病は、高齢期の残存歯数（現在歯数）の増加により加齢に伴い増加しています。むし歯有病者率は20歳代で80%切り、30歳代でも減少し、20～30歳代では健全歯数も増加しています。一方、40歳代以降では前回調査の年代別結果をスライドして反映される傾向にあります。むし歯の未処置率は70歳代までは減少していましたが80歳代以降で増加していました。歯周病は全世代で有病率が増加しており、高齢になるほど顕著で、重症化していました。8020達成率は前回調査35.1%で今回は49.7%と大幅な増加を認めましたが、更なる達成率の向上を目指すとともに、高齢者のむし歯・歯周病治療と補綴治療により機能的かつ衛生的な口腔環境づくりを目標とした積極的な介入が必要と思われれます。

《アンケートから見たこと》

歯みがきに関しては1日3回、3分以上が36%で前回より増加を認め、歯科補助用具の使用率は66.9%で高齢になるにつれ高くなる傾向にあります。これは歯科医院での年代別かかりつけ医の有無と歯みがき指導の割合に比例する値となり今後も定期歯科受診が必要と思われれます。

フッ化物洗口の認知度・実施率ともに依然として低い状態でした。幼児・学童期でのフッ化物洗口事業に加えて、今後は成人・高齢期でのフッ化物洗口事業をすすめていく必要があると思われれます。

かむ力に関しては50歳代より「かみにくいものがある」の割合が増加傾向にあり「奥歯両方でかめない」の割合に比例、また糖尿病有病者との関連性も認められ、臼歯部の歯周治療と補綴治療の必要性が示唆されました。

8020達成率が5割時代を迎え一定の目標に達しましたが、口腔と全身疾患、口腔と栄養など歯科に求められる分野が広がっております。これらの問題に対してライフステージごとに今回の県民歯科疾患実態調査の結果を活用して早期介入による対策を考えております。

最後に、この調査を実施するにあたり多大なご支援とご協力をいただきました関係者の皆様に深い感謝とお礼を申し上げます。

編 集

一般社団法人 鳥取県歯科医師会 公衆衛生委員会