

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



令和 6 年度病害虫発生予報第 2 号

令和 6 年 4 月 2 4 日
鳥取県病害虫防除所

予報の概要

区 分	農作物名	病 害 虫 名	発生時期	予想発生量
普 通 物	イ ネ	苗立枯病	—	平 年 並
		ばか苗病（育苗期）	—	平 年 並
		イネミズゾウムシ	平坦～中間地： やや早い 山間地： やや遅い	平 年 並
果 樹	ナ シ	黒斑病	やや早い	平 年 並
		黒星病	やや早い	やや多い
		赤星病	やや早い	平 年 並
		ハダニ類	やや早い	平 年 並
		アブラムシ類	やや早い	平 年 並
		カメムシ類	やや早い	多 い
	カ キ	灰色かび病	やや早い	平年並～ やや多い
		樹幹害虫 (ヒメコスカシバ、フタモンマダラメイガ)	やや早い	平 年 並
	ブドウ	灰色かび病	平 年 並	平 年 並
		べと病	平 年 並	やや多い
野 菜	ネ ギ	べと病	平 年 並	やや多い
		さび病	—	平 年 並
		ネギアザミウマ	—	やや多い
		ネギハモグリバエ	平 年 並	平 年 並
	ラッキョウ	ネギハモグリバエ	平 年 並	平 年 並
	スイカ	菌核病	平 年 並	平 年 並
		つる枯病	平 年 並	平 年 並
		うどんこ病	平 年 並	平 年 並
	スイカ・メロン	アブラムシ類	平 年 並	平 年 並
		ハダニ類	平 年 並	平 年 並

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



気象予報（抜粋）

1 か月予報（4月20日～5月19日：4月18日、広島地方气象台発表）

向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

向こう1か月の平均気温は、高い確率80%です。降水量は、多い確率40%です。


週別の気温は、1週目は、高い確率80%です。2週目は、高い確率70%です。

3～4週目は、高い確率60%です。

<向こう1か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



普通作物

[イ ネ]

1 苗立枯病

(1) 予報の内容

発生地域 県内全域

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 苗立枯病の予防防除が広く普及している。

イ 向こう1か月の気象予報から発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病後の防除は困難であるため、予防防除を徹底する。

イ 育苗環境を清潔に保ち、育苗中の温度管理及び水管理に注意する。

ウ リゾープス属菌による苗立枯病が発生した場合には、発病部分の回復は見込めないが、緑化期(但し、は種14日後まで)までであれば、発見後直ちにダコニール1000(使用回数は2回以内)の500～1,000倍液等をかん注することにより、蔓延を防止できる。

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



エ ムレ苗が発生した場合には、タチガレエースM液剤（育苗箱へのかん注は1回以内）の500～1,000倍液又はタチガレン液剤（育苗箱へのかん注は2回以内、ただしタチガレエースM液剤等のヒドロキシイソキサゾールを含む剤を使用した場合は1回以内）の500～1,000倍液を、1箱当たり0.5Lかん注し、夜間の保温と昼間の遮光に努め、苗の回復を図る。移植可能であれば、早めに本田に移植する。

2 ばか苗病（育苗期）

（1）予報の内容

発生地域 県内全域

発生量 平年並

（2）予報の根拠

前年の本病の発生は平年並であったため、本年用種子の保菌率は平年並と予想される。

（3）防除上注意すべき事項

ア 前年の発生ほ場から採種した粃は、種子として使用しない。

イ 比重選及び種子消毒を徹底する。

ウ 温湯種子消毒にあたっては、消毒時間、温度などを厳守する。消毒後の種子を保管する場合には、種子を十分に乾燥させ、清潔な冷暗所に保管する。浸種を行う場合には、必ず水道水を使用し、適宜、水の交換を行う。

エ 薬剤による種子消毒（低濃度長時間浸漬）にあたっては、薬液がよく浸透するように網袋にゆとりを持たせる。また、薬液の温度が10℃以下にならないように注意する。消毒後の浸種は停滞水中で行い、最初の3日間は水の交換を行わない。水温が高い場合など酸素不足になるおそれがあるときは、静かに換水する。なお、薬剤については、病害虫防除指針などを参考にする。

3 イネミズゾウムシ

（1）予報の内容

発生地域 県内全域

発生時期 やや早い（平坦～中間地）

やや遅い（山間地）

発生量 平年並

（2）予報の根拠

ア 4月21日現在、本種の飛翔に必要な有効温度の積算値は平坦～中間地で平年並、山間地で平年に比べて少ない。さらに、向こう1か月の気象予報から、発生時期は平坦～中間地でやや早く、山間地で平年に比べてやや遅くなるものと予想される。

イ 前年の第1世代成虫の予察灯への誘殺数は平年並であった。

（3）防除上注意すべき事項

育苗箱施用剤の防除効果が高いので、使用時期及び使用量を守り、1箱ずつ丁寧に薬剤を施用する。特に1箱当たりの施用量が不足すると、著しく防除効果が低下するので注意する。なお、薬剤については、病害虫防除指針などを参考にする。

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



果 樹

[ナ シ]

1 黒斑病

(1) 予報の内容

発生時期 やや早い
発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、県発生予察ほ場（園芸試験場）における孢子飛散量は、平年並～やや少ない。

イ 令和5年11～12月に行った越冬菌密度調査の結果、一年枝の病枝率及び短果枝の病芽率は平年に比べてやや低い～低く、一年枝上の病斑数は平年並であった。

ウ ナシの生育は平年に比べてやや早い。

エ 向こう1か月の気象予報から、発生時期はやや早く、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 小袋掛け終了までの薬剤散布の間隔は5～7日程度とし、特に小袋掛け直前の防除を徹底する。

イ 薬剤は、摘果期にベルコートフロアブル1，500倍液、ユニックス顆粒水和剤47の1，500倍液などを、小袋かけ中に有機銅水和剤（キノンドーフロアブル又はドキリンフロアブル）1，000倍とポリオキシソール水和剤1，500倍の混用液、ポリベリン水和剤1，500倍液などを散布する。

ウ 雌しべ感染を防ぐため、摘果する際はできる限り雌しべを取り除く。

2 黒星病

(1) 予報の内容

発生時期 やや早い
発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 県発生予察ほ場（園芸試験場）において、4月上旬の子嚢孢子飛散量（罹病落葉から飛散）は平年に比べて多く、分生子飛散量（罹病花そう基部から飛散）は平年並～やや多かった。

イ 令和6年1～2月に行った越冬菌密度調査の結果、腋花芽の病芽率は平年に比べてやや低かったが、今年の発生量から越冬伝染源である罹病落葉の量はやや多いと見込まれる。

ウ ナシの生育はやや早く、子嚢孢子飛散量の増加時期も例年に比べてやや早い。

エ これまでの気象経過及び向こう1か月の気象予報から、発生時期はやや早く、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 感染源となる果そう基部病斑、発病葉及び果実は見つけ次第切除し、園外で処分する。

イ 薬剤は、ファンタジスタ顆粒水和剤4，000倍液、カナメフロアブル4，000倍液、チウラム水和剤（トレノックスフロアブル又はチオノックフロアブル）500倍液、有機銅水和剤（キノンドーフロアブル又はドキリンフロアブル）1，000倍液、ベルコートフロアブル1，500倍液などを散布する。

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



ウ 多発後の薬剤散布は十分な薬効が期待できないばかりでなく、耐性菌発達のリスクを高めるため、予防散布に努める。また、耕種的防除により初期密度の低減を図る。

3 赤星病

(1) 予報の内容

発生時期 やや早い
発生量 平年並

(2) 予報の根拠

- ア 県発生予察ほ場（園芸試験場）において、冬孢子堆の成熟度は4月上旬に80～90%となり、成熟時期は平年に比べてやや早い。
- イ 昨年の発生量はやや少なく、越冬伝染源量も同様にやや少ないと見込まれる。
- ウ ナシの生育は平年に比べてやや早い。
- エ これまでの気象経過及び向こう1か月の気象予報から、発生時期はやや早く、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

例年発生が多い園又は初期病斑が多く認められた園では、4月下旬頃にDMI剤（アンビルフロアブル1，000倍液、スコア顆粒水和剤4，000倍液など）を追加散布する。ただし、耐性リスク管理の観点でDMI剤の使用回数（年2～3回まで、他系統の薬剤との混用又は混合剤での使用）に注意する。

4 ハダニ類

(1) 予報の内容

発生時期 やや早い
発生量 平年並

(2) 予報の根拠

- ア 県内巡回調査園におけるハダニ類の越冬量は、平年並～少なかった。
- イ ナシの生育は平年に比べてやや早い。
- ウ 向こう1か月の気象予報から発生時期はやや早く、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ハダニ類の発生が認められた場合は、カネマイトフロアブル1，500倍液などを単用で散布する。

5 アブラムシ類

(1) 予報の内容

発生時期 やや早い
発生量 平年並

(2) 予報の根拠

- ア 4月第3半旬現在、県発生予察ほ場（園芸試験場、殺虫剤無散布体系）において、アブラムシ類の発生は認められていない。
- イ ナシの生育は平年に比べてやや早い。
- ウ 向こう1か月の気象予報から、アブラムシ類の第1回目の発生盛期はやや早い5月下旬頃で、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア アブラムシ類の発生が多く認められるナシ園では、アドマイヤーフロアブル5，000倍液又はウララDF4，000倍液などを散布する。

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



イ アドマイヤーフロアブルなどのネオニコチノイド系殺虫剤の使用にあたっては、連用による薬剤抵抗性の発達を避けるため、最小限の使用とする。

6 カメムシ類（令和6年4月17日付けで病害虫発生予察注意報第1号を発表）

（1）予報の内容

発生時期 やや早い

発生量 多 い

（2）予報の根拠

ア クサギカメムシの越冬成虫数（ベニヤ板トラップ、県内10地点調査）は、トラップ当たり26.3頭（平年：7.5頭）と平年に比べて多かった。

イ 4月16日現在、集合フェロモントラップ（水盤式）調査における、チャバネアオカメムシの誘殺数は3頭（平年：0.2頭）と発生時期はやや早く、発生量が多い。

ウ ナシの生育は平年に比べてやや早い。

エ 向こう1か月の気象予報及び集合フェロモントラップ調査の結果から、春季におけるナシ園への成虫の飛来時期は、平年に比べてやや早い4月下旬頃で、発生量が多いと予想される。

（3）防除上注意すべき事項

令和6年度病害虫発生予察注意報第1号を参照のこと。

[カ キ]

1 灰色かび病

（1）予報の内容

発生時期 やや早い

発生量 平年並～やや多い

（2）予報の根拠

ア 4月下旬現在、県発生予察ほ場（園芸試験場）において本病の発生は認められていない。

イ 昨年の発生量は平年並であり、越冬伝染源量も平年並と見込まれる。

ウ 4月中旬に降雹による葉の破れ等の被害が認められた。

エ カキの生育は平年並～やや遅い。

オ 向こう1か月の気象予報から、発生時期はやや早く、発生量は平年並～やや多いと予想される。

（3）防除上注意すべき事項

ア 本病原菌は低温・多湿条件を好むため、天候不順が続くと本病が発生しやすい。また、強風などによって若葉が傷ついた場合に突発的に発生しやすい。

イ 西条、伊豆などの品種では、本病の発生が多い傾向である。

ウ 降霜により霜害を受けたほ場では、本病の発生に注意し、防除対策を徹底する。

エ 防除薬剤は、フルピカフロアブル3,000倍液、ゲッター水和剤1,500倍液又はオンリーワンフロアブル2,000倍液などを散布する。

2 樹幹害虫（ヒメコスカシバ、フタモンマダラメイガ）

（1）予報の内容

発生時期 やや早い

発生量 平年並

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



(2) 予報の根拠

ア 昨年の樹幹害虫の被害量は平年並であり、越冬量は平年並と見込まれる。

イ カキの生育は平年並～やや遅い。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。また、越冬世代成虫の発生は、平年に比べてやや早い4月下旬頃から始まると見込まれる。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 防除は幼虫の食入防止を目的に、第1世代幼虫の発生時期である4～5月を目安に1回目の薬剤処理を行う。

イ 薬剤はフェニックスフロアブル200倍液（使用時期は開花期まで）又はガットサイドSの1.5倍液を樹幹害虫の被害が多い部位（樹幹部や枝基部）を中心に処理する。

[ブドウ]

1 灰色かび病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月下旬現在、県発生予察ほ場（砂丘地農業研究センター）における本病の発生は認められていない。

イ ブドウの生育は、地域によってばらつきがあるものの平年並～やや遅い。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 病原菌は低温・多湿条件を好むため、開花期が天候不順になると、本病が発生しやすい。

イ 薬剤はパスワード顆粒水和剤1,500倍液、スイッチ顆粒水和剤3,000倍液、ゲッター水和剤1,500倍液、ポリベリン水和剤1,000倍液、パレード15フロアブル3,000倍液、ロブラールくん煙剤100g/くん煙室容積300～400m³（高さ2m、床面積150～200m²）などを使用する。

ウ 施設栽培では多湿条件が続くと発病が増加するので、早朝に換気を行って施設内の湿度を下げる。

2 ベと病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 昨年の発生量はやや多く、越冬伝染源となる罹病落葉の量もやや多いと見込まれる。

イ 4月下旬現在、県発生予察ほ場（砂丘地農業研究センター）における本病の発生は認められていない。

ウ ブドウの生育は、地域によってばらつきがあるものの平年並～やや遅い。

エ 向こう1か月の気象予報から、発生時期は平年並、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 開花期以降の天候不順は、本病の発生を助長するので注意する。

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



- イ 薬剤は、落花後（小豆大）にアミスター10フロアブル1，000倍液、ストロビドライフフロアブル2，000倍液又はベトファイター顆粒水和剤3，000倍液などを使用する。
- ウ 発病果及び発病葉は見つけ次第切除し、園外で処分する。

野菜

[ネギ]

1 ベと病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、県西部の現地調査ほ場において、本病の発生量は平年並である。

イ 本病は、15～20℃程度で降雨が続くと急激に発病が増加する。これまでの気象経過及び向こう1か月の気象予報から、発生時期は平年並、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病後の蔓延が早いいため、発病前からの防除に努める。

イ マンゼブ水和剤（ジマンダイセン水和剤600倍液、ペンコゼブフロアブル500～600倍液など）、ランマンフロアブル2，000倍液、アリエッティ水和剤800倍液、ダイナモ顆粒水和剤2，000倍液、ピシロックフロアブル1，000倍液などを予防散布する。

ウ 発病を認めたら直ちに、リドミルゴールドMZ1，000倍液、フォリオゴールド800～1，000倍液、レーバスフロアブル2，000倍液、プロポーズ顆粒水和剤1，000倍液、メジャーフロアブル2，000倍液、フェスティバルC水和剤1，000倍液、シグナムWDG1，500倍、ザンプロDMフロアブル1，500～2，000倍液、カーニバル水和剤1，000倍液などを散布する。

エ 同一成分を含む薬剤は連用しない。また、成分ごとの総使用回数に注意して薬剤を選定する。

2 さび病

(1) 予報の内容

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場における本病の発生量は平年並である。

イ 春期が比較的低温で、降雨が多いと発生量が多くなる。これまでの気象経過及び向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 被害葉等は伝染源となるので収穫残渣等はほ場の近くに放置しない。

イ 発病後の散布は効果が劣るため、予防散布に重点をおく。発病前や発病初期には7～10日間隔でマンゼブ水和剤（ジマンダイセン水和剤600倍液、ペンコゼブフロアブル500～600倍液など）、ベルコート水和剤2，000倍液、ラリー水和剤2，000倍液、メジャーフロアブル2，000倍液、カリグ

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



リーン 800 倍液などを散布する。

ウ 既に多発しているほ場では、アミスター 20フロアブル 2,000 倍液、ストロビーフロアブル 2,000 倍液、カナメフロアブル 4,000～8,000 倍液、カーニバル水和剤 1,000 倍液、オンリーワンフロアブル 1,000 倍液あるいは、オンリーワンフロアブル 1,000 倍液にカリグリーンを 800 倍液で混用して散布する。

3 ネギアザミウマ

(1) 予報の内容

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場において、ネギアザミウマの発生量はやや多い。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 育苗期後半から定植当日に使用する剤は、病害虫防除指針や各地区の防除暦を参考にする。

イ 本圃生育中のネギに対しては、アニキ乳剤 1,000 倍液、アグロスリン乳剤 2,000 倍液、ディアナ SC 2,500～5,000 倍液、トクチオン乳剤 1,000 倍液などを散布する。

4 ネギハモグリバエ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場において、ネギハモグリバエの発生は認められていない。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 育苗期後半から定植当日に使用する剤は、病害虫防除指針や各地区の防除暦を参考にする。

イ 本圃生育中のネギに対しては、アニキ乳剤 1,000 倍液、アグロスリン乳剤 2,000 倍液、ディアナ SC 2,500～5,000 倍液、ヨーバルフロアブル 2,500～5,000 倍液などを散布する。

[ラッキョウ]

1 ネギハモグリバエ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場において、ネギハモグリバエの発生は認められていない。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

薬剤はビリーブ水和剤 1,500 倍液、プレバソフロアブル 5の2,000 倍液、ディアナ SC 2,500～5,000 倍液などを散布する。

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



[スイカ]

1 菌核病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場において、本病の発生は認められていない。

イ 本病は、気温15～20℃程度で多湿条件が続くと発病が増加する。向こう1か月の気象予報から、発生時期は平年並、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 하우스やトンネル内が過湿にならないよう適度に換気を行う。マルチ上にたまった水は適宜、穴を開けて排水する。また、咲き終わった花卉は発病しやすいので、摘み取って除去する。

イ 薬剤は、ベルコート水和剤1,000倍液、カンタストライフフロアブル1,000～1,500倍液、セイビアーフロアブル20の1,000倍液、スクレアフロアブル2,000倍液、ロブラール水和剤1,000倍液、パレード20フロアブル2,000～4,000倍液などを散布する。

ウ 曇雨天が続く場合は、ハウスではスミレックスくん煙顆粒6g/100m³(床面積50m²×高さ2m)、ロブラールくん煙剤100g/300～400m³(高さ2m、床面積150～200m²)などを使用する。

2 つる枯病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場において、本病の発生は認められていない。

イ 本病は降雨や過湿で発病が増加する。向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 하우스やトンネル内が過湿にならないよう適度に換気を行う。

イ 本病は株元を中心に発病が始まるので、株元にも薬液が十分かかるように散布を行う。薬剤は、ジマンダイセン水和剤600倍液、アントラコール顆粒水和剤400～600倍液、ダコニール1000の700～1,000倍液などを散布する。

3 うどんこ病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場において、本病の発生は認められていない。

イ 本病は、25℃前後の気温と適度な湿度で発病が増加する。向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 本病は、収穫期の草勢低下により発生量が増加する。蔓延後の散布は、防除効果が劣るため、発生前からの防除を徹底する。

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



- イ 発生前には、ベルコート水和剤 1, 000 倍液、イオウフロアブル 500 倍液、トリフミン水和剤 3, 000 倍液などを散布する。
- ウ 発生初期のほ場では、カリグリーン 800 倍液、ショウチノスケフロアブル 2, 000 倍液などを散布する。

[スイカ・メロン]

1 アブラムシ類

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場において、アブラムシ類の発生は認められていない。

イ 4月第3半旬現在、県発生予察ほ場（園芸試験場露地ほ場）における黄色水盤トラップへの飛来量は平年並である。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア ハウスの換気部分や出入口には防虫ネット被覆を行い、アブラムシ類の侵入防止に努める。

イ 葉裏を注意して観察し、初期防除を徹底する。

ウ スイカのハウス栽培では、交配前にはチェス顆粒水和剤 5, 000 倍液などのミツバチへの影響のない薬剤を散布する。

エ スイカのトンネル栽培では、つる引き誘引時期にチェス顆粒水和剤 5, 000 倍液、交配前にモスピラン顆粒水溶剤 2, 000 倍液などを散布する。

オ メロンでは、チェス顆粒水和剤 5, 000 倍液、バリアード顆粒水和剤 4, 000 倍、モスピラン顆粒水溶剤 8, 000 倍液などを散布する。

2 ハダニ類

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 4月中旬現在、現地調査ほ場においてハダニ類の発生は認められていない。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ハウスなどで発生初期には、スイカ、メロンともにバロックフロアブル

2, 000 倍液、ダニサラバフロアブル 1, 000 倍液などを散布する。多発した場合はコロマイト乳剤 1, 000 倍液、マイトコーネフロアブル 1, 000 倍液などを散布する。

【！県内の病害虫に関する情報を配信中！】

鳥取県病害虫防除所 HP にて病害虫予察情報を随時更新しています。
各種情報は右記 QR コードからご覧いただけます。



[おしらせ]

農薬の使用に当たっては、農薬使用基準を遵守するとともに、周辺への飛散には十分注意しましょう。

農薬の詳しい登録内容は、農林水産省の「農薬登録情報提供システム」から検索できます (<https://pesticide.maff.go.jp/>)。

なお、農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ず御確認ください。

<鳥取県病害虫防除所ホームページ>

アドレス <https://www.jppn.ne.jp/tottori/>

病害虫発生予察情報、フェロモントラップ調査結果（ナシのシンクイムシ類など）などの参考情報、病害虫の診断方法などの情報をお知らせしていますので、御利用ください。

<お問い合わせ>

普通作物関係：〒680-1142 鳥取市橋本 260

鳥取県病害虫防除所

（電話：0857-53-1345、電子メール：boujyot@titan.ocn.ne.jp）

もしくは

鳥取県農業試験場環境研究室

（電話：0857-53-0721、ファクシミリ：0857-53-0723）

果樹・野菜・花き関係

〒689-2221 東伯郡北栄町由良宿 2048

鳥取県園芸試験場環境研究室

（電話：0858-37-4211、ファクシミリ：0858-37-4822）

※次回、予報第3号の発表は5月15日（水）の予定です。

なお、予定日と実際の発表日が前後することがありますので、御注意ください。

令和6年 春の農作業安全運動（3月1日～5月31日）実施中

～農作業事故は自分ごと～「安全装置」と「安全確認」で“もしも”に備えましょう

鳥取県農林水産部経営支援課ホームページ、農業機械・農作業安全

令和6年 春の農作業安全運動（3月1日～5月31日）

<https://www.pref.tottori.lg.jp/119790.htm>



<連絡先>

〒680-8570 鳥取市東町 1-220

鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課農業普及推進室

（TEL：0857-26-7327、FAX：0857-26-7294）