

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.5)

令和6年6月25日
鳥取県病虫害防除所

表1－1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年	本年	前年	本年	平年*
4月計	3	0.8	19	0	7	2.2
5・上	13	3.9	211	4.0	532	4.5
・中	97	7.0	557	3.6	223	59.2
・下	477	9.2	43	29.4	859	50.1
6・上	91	13.6	欠測	21.8	40	48.2
・中	1078	30.5	1199	33.2	400	38.9
・下		134.5		93.2		146.8

*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

**八頭町はR3年度から調査地点を変更。

***湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1－2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年	本年	前年	本年	平年*
4月計	0	0	1	0	0	0
5・上	0	0	1	0	1	0.2
・中	3	0	8	0	1	1.6
・下	9	1.0	0	3.0	5	0.8
6・上	0	1.9	欠測	0	1	0.5
・中	84	7.0	115	3.5	83	2.0
・下		30.1		8.9		7.5

*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

**八頭町はR3年度から調査地点を変更。

***湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1－3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年	本年	前年	本年	平年*
4月計	0	0.5	0	0	6	0.1
5・上	0	0.3	9	1	51	1.5
・中	9	0.3	62	0.9	89	15.4
・下	61	0.4	41	1.1	176	33.9
6・上	35	2.0	欠測	3.6	268	38.0
・中	985	6.9	2010	0.9	4469	61.3
・下		11.6		2.9		119.3

*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

**八頭町はR3年度から調査地点を変更。

***湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表2 集合フェロモントラップ[※]におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	河原町 ^{****}		北栄町		米子市 ^{*****}		南部町	
	本年	前年	本年	平年 ^{**}	本年	前年	本年	平年 ^{***}
4月計	9	1.0	18	11.9	1	0	0	0.3
5・上	8	8.0	108	31.1	0	0	0	0.2
・中	142	22.7	56	28.8	1	0	0	0
・下	381	17.3	184	19.3	0	0	0	0
6・上	682	10.9	93	23.0	0	0	0	0.3
・中	3686	22.1	89	9.8	1	0	0	0.3
・下		13.5		29.8		1.0		0.3

※ 河原町（水盤式）は果樹園横、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。南部町（乾式）は会見に設置（西部普及所調査）。

** 平年：北栄町：H26～R5、南部町：H29～R5

**** R5年度から郡家町花原の調査地点を河原町小倉に変更。***** R5年から設置地点を変更。

<1 情報の内容 6月中旬現在 >

- (1) チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、北栄町で平年に比べて多く、河原町で前年に比べて多い。米子市で前年並、南部町で平年並。
- (2) クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。
- (3) ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。