

令和4年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ黒斑病

令和4年10月7日
鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(令和4年)

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 ¹⁾ (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年 ²⁾
河原町	0	－ ⁵⁾	－ ⁵⁾	0.6	－ ⁵⁾	－ ⁵⁾	14.9	－ ⁵⁾	－ ⁵⁾
佐治町	1.1	0	－ ³⁾	0	4.6	－ ³⁾	1.9	6.1	－ ³⁾
青谷町	1.3	5.3	－ ⁴⁾	0.5	8.2	－ ⁴⁾	5.7	7.8	－ ⁴⁾
八頭町	2.3	0	0.3	1.0	0.5	1.4	3.8	0.5	3.7
湯梨浜町（別所）	2.6	2.1	1.9	0.6	0	1.9	1.1	1.1	3.2
湯梨浜町（勝負谷）	4.2	1.5	0.9	1.0	0.5	1.6	2.8	8.3	4.8
倉吉市	2.3	0.5	0.6	2.4	0	1.6	2.6	1.6	4.1
北栄町（園試）	2.6	1.7	3.4	5.4	9.4	10.9	10.7	15.1	17.9
琴浦町	6.9	1.6	1.4	0.5	2.5	3.4	4.9	1.6	3.1
南部町	0.9	0	— ⁴⁾	0	0	— ⁴⁾	0.8	0.5	— ⁴⁾
平 均	2.4	1.4	1.4	1.2	2.9	3.5	4.9	4.7	6.1

(注)

- 1) 1園当たり10新梢について全葉数及び病葉数を調査
- 2) 平成24～令和3年の期間の平均値。
- 3) 令和3年より調査地点を変更した。
- 4) 令和元年より調査地点を変更した。
- 5) 令和4年6月から調査園を変更。

<要約>

9月26、29日に実施した巡回調査の結果、新梢葉における発病率は4.9%（平年：6.1%）と平年並であった。

<対策>

今後、収穫後の防除を行っていない園では収穫後防除を実施する。防除薬剤はアントラコール顆粒水和剤の500倍液等がある。