

# 病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.1)

令和元年5月14日  
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町 |      | 鳥取市河原町 |      | 湯梨浜町 |      | 北栄町 |      |
|-----|-----|------|--------|------|------|------|-----|------|
|     | 本年  | 平年*  | 本年     | 平年*  | 本年   | 平年*  | 本年  | 平年*  |
| 4・上 | 0   | 0.0  |        |      | 0    | 0.0  | 0   | 0.0  |
| ・中  | 0   | 0.0  |        |      | 0    | 0.0  | 0   | 0.0  |
| ・下  | 2   | 1.6  |        |      | 1    | 1.0  | 0   | 1.5  |
| 5・上 | 4   | 12.2 | 1      | 3.5  | 4    | 8.5  | 1   | 4.5  |
| ・中  |     | 40.9 |        | 18.1 |      | 21.4 |     | 55.9 |
| ・下  |     | 43.6 |        | 24.6 |      | 34.4 |     | 22.6 |

\*平年：H21～30

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町 |     | 鳥取市河原町 |     | 湯梨浜町 |     | 北栄町 |     |
|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|
|     | 本年  | 平年* | 本年     | 平年* | 本年   | 平年* | 本年  | 平年* |
| 4・上 | 0   | 0.1 |        |     | 0    | 0.1 | 0   | 0.0 |
| ・中  | 0   | 0.2 |        |     | 0    | 0.1 | 0   | 0.0 |
| ・下  | 15  | 0.5 |        |     | 5    | 0.4 | 0   | 0.0 |
| 5・上 | 0   | 2.8 | 0      | 1.7 | 0    | 0.8 | 0   | 0.2 |
| ・中  |     | 4.1 |        | 3.1 |      | 0.3 |     | 1.4 |
| ・下  |     | 7.9 |        | 2.9 |      | 1.4 |     | 0.8 |

\*平年：H21～30

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町 |     | 鳥取市河原町 |     | 湯梨浜町 |     | 北栄町 |     |
|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|
|     | 本年  | 平年* | 本年     | 平年* | 本年   | 平年* | 本年  | 平年* |
| 4・上 | 0   | 0.0 |        |     | 0    | 0.0 | 0   | 0.0 |
| ・中  | 0   | 0.0 |        |     | 0    | 0.0 | 0   | 0.0 |
| ・下  | 0   | 0.1 |        |     | 1    | 0.0 | 0   | 0.0 |
| 5・上 | 0   | 0.4 | 0      | 0.2 | 0    | 0.2 | 1   | 0.6 |
| ・中  |     | 2.0 |        | 2.1 |      | 2.5 |     | 5.7 |
| ・下  |     | 2.4 |        | 3.4 |      | 6.6 |     | 7.2 |

\*平年：H21～30

表2 集合フェロモントラップ\*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 八頭町 |      | 北栄町 |      | 米子市 |      | 南部町 |     |
|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
|     | 本年  | 平年** | 本年  | 平年** | 本年  | 前年   | 本年  | 前年  |
| 4・上 | 0   | 0.0  | 0   | 0.2  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0 |
| ・中  | 0   | 0.1  | 2   | 0.3  | 0   | 1.3  | 0   | 0.0 |
| ・下  | 0   | 1.6  | 8   | 8.0  | 1   | 3.3  | 2   | 0.0 |
| 5・上 | 3   | 6.9  | 39  | 18.7 | 2   | 1.3  | 0   | 0.0 |
| ・中  |     | 8.4  |     | 20.8 |     | 10.0 |     | 0.0 |
| ・下  |     | 7.6  |     | 11.8 |     | 2.0  |     | 0.0 |

\* …八頭町（水盤式）は水田畦畔、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。南部町（乾式）は会見に設置。米子市及び南部町は平成29年から調査開始（西部農業改良普及所調査）。

\*\* …平年：H21～30

## < 1 情報の内容 5月上旬現在 >

- （1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、全地点で平年並～やや少ない。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、北栄町で平年に比べてやや多い。
- （2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、全地点で少ない。
- （3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、全地点で平年並～やや少ない。