

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.3)

平成30年6月14日
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	1.6			5	0.5	0	1.5
5・上	2	22.9	5	3.0	1	8.4	7	4.8
・中	155	27.7	91	9	86	11.8	410	16.6
・下	36	52.0	15	25.0	51	29.3	48	20.5
6・上	5	27.2	20	12.0	31	17.7	3	19.0
・中		64.3		48.0		43.1		35.4
・下		119.1		59.0		62.6		53.2

*平年：H20～29

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.7			2	0.4	0	0
5・上	0	2.8	1	2.0	0	0.8	0	0.2
・中	25	1.6	13	2.0	2	0.0	9	0.5
・下	28	5.5	5	3.0	6	0.8	4	0.4
6・上	5	10.3	4	2.0	0	2.1	0	0.4
・中		19.2		5.0		1.4		1.6
・下		32.4		4.0		5.8		3.8

*平年：H20～29

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.1			0	0	0	0
5・上	0	0.5	1	0	0	0.2	0	0.6
・中	8	1.2	4	2.0	13	1.1	31	3.0
・下	6	3.5	6	4.0	7	6.0	16	8.3
6・上	10	8.0	8	5.0	14	13.9	11	12.5
・中		40.9		32.0		28.9		53.2
・下		102.5		63.0		73.6		127.6

*平年：H20～29

表2 集合フェロモントラップ*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町		北栄町		米子市		南部町	
	本年	平年**	本年	平年**	本年	前年	本年	前年
4月計	0	1.7	8.0	8.3	5	2	0	0
5・上	1	15.1	10	18.9	1	0	0	1
・中	6	10.9	51	16.9	11	1	0	0
・下	1	9.9	16	13.1	1	1	0	0
6・上	2	37.9	3	22.5	0	1	0	0
・中		27.4		18.4		1		0
・下		48.1		14.3		6		0

* …八頭町（水盤式）は水田畦畔、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所選果場、南部町（乾式）は会見選果場に設置。米子市及び南部町はH29年度から調査開始（西部農業改良普及所調査）。

** …平年：H20～29

< 1 情報の内容 6月上旬現在 >

- （1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、平年に比べて八頭町、北栄町でやや少なく、河原町、湯梨浜町でやや多い。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は八頭町、北栄町で平年に比べやや少ない。
- （2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、全地点で平年並。
- （3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、全地点で平年並。