

ナシ・ハダニ類発生状況調査結果

平成30年7月23日
鳥取県病害虫防除所

寄生葉率(%)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本 年	前 年	平 年*	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
鳥取市佐治町	0.0	0	11.5	5.0	13.3	9.5	0.0	0	0.0
鳥取市青谷町	0.0	0	1.0	5.0	0	4.2	0.0	0	0.0
八頭町	0.0	0	13.8	3.3	0	1.8	0.0	0	0.5
倉吉市	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.2
湯梨浜町別所	1.7	0	5.3	15.0	5.0	4.8	0.0	0	4.8
北栄町**	0.0	0	0.0	5.0	0	0.0	1.7	0	0.0
琴浦町竹ノ内	1.7	0	11.3	0.0	0	6.2	0.0	0	0.0
大山町坪田	0.0	91.7	9.3	3.3	3.3	0.3	0.0	0	0.0
南部町	1.7	0	0.3	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
平 均	0.6	10.2	5.9	4.1	2.4	3.0	0.2	0.0	0.6

* 平年値:平成20～29年

** 平年値:平成22～29年

10葉当たり寄生頭数(頭/10葉)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
鳥取市佐治町	0.0	0	3.6	0.7	2.2	1.6	0.0	0	0.0
鳥取市青谷町	0.0	0	0.1	0.8	0	0.6	0.0	0	0.0
八頭町	0.0	0	8.3	0.5	0	0.2	0.2	0	0.1
倉吉市	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.1
湯梨浜町別所	0.3	0	0.8	4.8	0.5	0.8	0.0	0	1.1
北栄町**	0.0	0	0.0	0.5	0	0.0	0.6	0	0.0
琴浦町竹ノ内	0.2	0	2.9	0.0	0	2.1	0.0	0	0.0
大山町坪田	0.0	79.7	8.0	0.3	1.2	0.1	0.0	0	0.0
南部町	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0
平 均	0.1	8.9	2.6	0.8	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1

* 平年値:平成20～29年

** 平年値:平成22～29年

(概要)

・調査は7月19日に実施。調査地点は黒斑病と共通。

・ハダニ類の発生量は、ほぼ平年並。

〔クワオオハダニ〕 前年比:並、平年比:やや少ない

〔カンザワハダニ〕 前年比:やや多、平年比:並

〔ナミハダニ〕 前年比:並、平年比:並