

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.7)

平成30年7月23日
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	1.6			5	0.5	0	1.5
5月計	193	102.6	96	37.2	138	49.6	465	41.9
6・上	5	27.2	20	12.1	31	17.7	3	19.0
・中	10	64.3	20	48.0	8	43.1	10	35.4
・下	99	119.1	51	58.5	59	62.6	281	53.2
7・上	99	307.8	56	99.7	58	106.0	47	139.5
・中	7	476.2	52	172.1	7	95.9	5	132.0
・下		465.8		310.1		99.4		122.7

*平年：H20～29

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.7			2	0.4	0	0.0
5月計	53	9.9	19	6.4	8	1.6	13	1.1
6・上	5	10.3	4	2.1	0	2.1	0	0.4
・中	5	19.2	2	5.1	0	1.4	1	1.6
・下	48	32.4	11	4.3	2	5.8	20	3.8
7・上	111	98.1	30	20.2	20	14.7	14	10.2
・中	106	254.3	85	70.6	0	25.0	16	28.8
・下		480.1		207.7		67.9		70.7

*平年：H20～29

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.1			0	0.0	0	0.0
5月計	8	5.2	11	6.2	20	7.3	47	11.9
6・上	10	8.0	8	4.9	14	13.9	11	12.5
・中	15	40.9	16	31.6	5	28.9	28	53.2
・下	10	102.5	11	62.7	14	73.6	51	127.6
7・上	19	148.4	10	88.2	8	85.0	28	141.8
・中	1	387.1	11	98.7	6	70.9	2	76.7
・下		335.5		97.9		76.6		41.3

*平年：H20～29

表2 集合フェロモントラップ*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町		北栄町		米子市		南部町	
	本年	平年**	本年	平年**	本年	前年	本年	前年
4月計	0	1.7	8	8.3	5	2	0	0
5月計	8	35.9	77	48.9	13	2	0	1
6・上	2	37.9	3	22.5	0	1.0	0	0.0
・中	14	27.4	3	18.4	6	1.0	0	0.0
・下	30	48.1	32	14.3	31	6.0	1	0.0
7・上	34	268.6	25	34.5	17	6.0	0	2.0
・中	0	350.2	0	35.6	0	1.0	0	0.0
・下		332.4		25.5		0.0		0.0

* …八頭町（水盤式）は水田畦畔、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所選果場、南部町（乾式）は会見選果場に設置。米子市及び南部町は本年度から調査開始（西部農業改良普及所調査）。

** …平年：H20～29

< 1 情報の内容 7月中旬現在 >

- （1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、全地点平年比やや少ない。集合フェロモントラップの誘殺数は、北栄町、八頭町で平年より少ない。
- （2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、鳥取市は平年比やや多く、八頭町、湯梨浜町、北栄町はやや少ない。
- （3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、全地点平年比やや少ない。