

# 病虫害発生予察指導情報

( 果樹全般・果樹カメムシ類 No. 8 )

平成30年8月3日  
鳥取県病虫害防除所

表1 - 1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町 |       | 鳥取市河原町 |       | 湯梨浜町 |       | 北栄町 |       |
|-----|-----|-------|--------|-------|------|-------|-----|-------|
|     | 本年  | 平年*   | 本年     | 平年*   | 本年   | 平年*   | 本年  | 平年*   |
| 4月計 | 0   | 1.6   |        |       | 5    | 0.5   | 0   | 1.5   |
| 5月計 | 193 | 102.6 | 96     | 37.2  | 138  | 49.6  | 465 | 41.9  |
| 6月計 | 114 | 210.5 | 91     | 119.0 | 98   | 123.4 | 294 | 107.6 |
| 7・上 | 99  | 307.8 | 56     | 99.7  | 58   | 106.0 | 47  | 139.5 |
| ・中  | 7   | 476.2 | 52     | 172.1 | 7    | 95.9  | 5   | 132.0 |
| ・下  | 13  | 465.8 | 84     | 310.1 | 16   | 99.4  | 73  | 122.7 |
| 8・上 |     | 394.6 |        | 301.0 |      | 168.9 |     | 242.5 |
| ・中  |     | 355.2 |        | 294.0 |      | 159.5 |     | 177.9 |
| ・下  |     | 298.9 |        | 243.0 |      | 123.9 |     | 153.7 |

\*平年：H20～29

表1 - 2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町 |       | 鳥取市河原町 |       | 湯梨浜町 |       | 北栄町 |      |
|-----|-----|-------|--------|-------|------|-------|-----|------|
|     | 本年  | 平年*   | 本年     | 平年*   | 本年   | 平年*   | 本年  | 平年*  |
| 4月計 | 0   | 0.7   |        |       | 2    | 0.4   | 0   | 0.0  |
| 5月計 | 53  | 9.9   | 19     | 6.4   | 8    | 1.6   | 13  | 1.1  |
| 6月計 | 58  | 61.8  | 17     | 12.0  | 2    | 9.4   | 21  | 5.8  |
| 7・上 | 111 | 98.1  | 30     | 20.2  | 20   | 14.7  | 14  | 10.2 |
| ・中  | 106 | 254.3 | 85     | 70.6  | 0    | 25.0  | 16  | 28.8 |
| ・下  | 290 | 480.1 | 265    | 207.7 | 11   | 67.9  | 49  | 70.7 |
| 8・上 |     | 514.4 |        | 286.0 |      | 126.5 |     | 99.3 |
| ・中  |     | 477.1 |        | 324.0 |      | 168.3 |     | 94.4 |
| ・下  |     | 274.8 |        | 191.0 |      | 92.0  |     | 36.1 |

\*平年：H20～29

表1 - 3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町 |       | 鳥取市河原町 |       | 湯梨浜町 |       | 北栄町 |       |
|-----|-----|-------|--------|-------|------|-------|-----|-------|
|     | 本年  | 平年*   | 本年     | 平年*   | 本年   | 平年*   | 本年  | 平年*   |
| 4月計 | 0   | 0.1   |        |       | 0    | 0.0   | 0   | 0.0   |
| 5月計 | 8   | 5.2   | 11     | 6.2   | 20   | 7.3   | 47  | 11.9  |
| 6月計 | 35  | 151.4 | 35     | 97    | 33   | 116.5 | 90  | 193.2 |
| 7・上 | 19  | 148.4 | 10     | 88.2  | 8    | 85.0  | 28  | 141.8 |
| ・中  | 1   | 387.1 | 11     | 98.7  | 6    | 70.9  | 2   | 76.7  |
| ・下  | 8   | 335.5 | 24     | 97.9  | 5    | 76.6  | 22  | 41.3  |
| 8・上 |     | 332.2 |        | 135.0 |      | 184.8 |     | 68.9  |
| ・中  |     | 158.7 |        | 130.0 |      | 102.8 |     | 70.3  |
| ・下  |     | 74.1  |        | 72.0  |      | 64.5  |     | 36.8  |

\*平年：H20～29

表2 集合フェロモントラップ\*におけるチャバネアカメムシ誘殺数(頭)

| 月・旬 | 八頭町 |       | 北栄町 |      | 米子市 |     | 南部町 |     |
|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|     | 本年  | 平年**  | 本年  | 平年** | 本年  |     | 本年  |     |
| 4月計 | 0   | 1.7   | 8   | 8.3  | 5   | 2   | 0   | 0   |
| 5月計 | 8   | 35.9  | 77  | 48.9 | 13  | 2   | 0   | 1   |
| 6月計 | 46  | 113.1 | 38  | 58.8 | 37  | 7.0 | 1   | 0.0 |
| 7・上 | 34  | 268.6 | 25  | 34.5 | 17  | 6.0 | 0   | 2.0 |
| ・中  | 0   | 350.2 | 0   | 35.6 | 0   | 1.0 | 0   | 0.0 |
| ・下  | 0   | 332.4 | 0   | 25.5 | 2   | 0.0 | 0   | 0.0 |
| 8・上 |     | 346.1 |     | 30.9 |     | 0.0 |     | 0.0 |
| ・中  |     | 99.1  |     | 15.0 |     | 0.0 |     | 0.0 |
| ・下  |     | 37.0  |     | 2.8  |     | 1.0 |     | 0.0 |

\* ...八頭町(水盤式)は水田畦畔、北栄町(水盤式)は果樹園横、米子市(乾式)は別所選果場、

南部町(乾式)は会見選果場に設置。米子市及び南部町は本年度から調査開始(西部農業改良普及所調査)。

\*\* ...平年: H19~28

#### < 1 情報の内容 7月下旬現在 >

- (1) チャバネアカメムシの誘殺数は平年比やや少ない。
- (2) クサギカメムシの誘殺数は、平年比で、鳥取市はやや多く、八頭町は平年並、湯梨浜町及び北栄町はやや少ない。
- (3) ツヤアカメムシの誘殺数は平年比やや少ない。
- (4) 7月下旬現在、県予察ほ場(園芸試験場、無袋・殺虫剤無散布、ゴールド二十世紀)におけるカメムシ類の飛来は未確認。また、園芸試験場の防風樹であるサンゴジュの実へのカメムシ類の飛来も未確認である。