

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.9)

平成30年8月13日
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	1.6			5	0.5	0	1.5
5月計	193	102.6	96	37.2	138	49.6	465	41.9
6月計	114	210.5	91	119.0	98	123.4	294	107.6
7・上	99	307.8	56	99.7	58	106.0	47	139.5
・中	7	476.2	52	172.1	7	95.9	5	132.0
・下	13	465.8	84	310.1	16	99.4	73	122.7
8・上	59	394.6	264	301.0	61	168.9	119	242.5
・中		355.2		294.0		159.5		177.9
・下		298.9		243.0		123.9		153.7

*平年：H20～29

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.7			2	0.4	0	0.0
5月計	53	9.9	19	6.4	8	1.6	13	1.1
6月計	58	61.8	17	12.0	2	9.4	21	5.8
7・上	111	98.1	30	20.2	20	14.7	14	10.2
・中	106	254.3	85	70.6	0	25.0	16	28.8
・下	290	480.1	265	207.7	11	67.9	49	70.7
8・上	239	514.4	281	286.0	5	126.5	65	99.3
・中		477.1		324.0		168.3		94.4
・下		274.8		191.0		92.0		36.1

*平年：H20～29

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.1			0	0.0	0	0.0
5月計	8	5.2	11	6.2	20	7.3	47	11.9
6月計	35	151.4	35	97	33	116.5	90	193.2
7・上	19	148.4	10	88.2	8	85.0	28	141.8
・中	1	387.1	11	98.7	6	70.9	2	76.7
・下	8	335.5	24	97.9	5	76.6	22	41.3
8・上	18	332.2	107	135.0	53	184.8	102	68.9
・中		158.7		130.0		102.8		70.3
・下		74.1		72.0		64.5		36.8

*平年：H20～29

表2 集合フェロモントラップ*におけるチャバネオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町		北栄町		米子市		南部町	
	本年	平年**	本年	平年**	本年	昨年	本年	昨年
4月計	0	1.7	8	8.3	5	2	0	0
5月計	8	35.9	77	48.9	13	2	0	1
6月計	46	113.1	38	58.8	37	7.0	1	0.0
7・上	34	268.6	25	34.5	17	6.0	0	2.0
・中	0	350.2	0	35.6	0	1.0	0	0.0
・下	0	332.4	0	25.5	2	0.0	0	0.0
8・上	0	346.1	0	30.9	1	0.0	0	0.0
・中		99.1		15.0		0.0		0.0
・下		37.0		2.8		1.0		0.0

* …八頭町（水盤式）は水田畦畔、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所選果場、南部町（乾式）は会見選果場に設置。米子市及び南部町は本年度から調査開始（西部農業改良普及所調査）。

** …平年：H20～29

< 1 情報の内容 8月上旬現在 >

- (1) チャバネオカメムシの誘殺数は平年並～やや少ない。
- (2) クサギカメムシの誘殺数は、平年比で八頭町、鳥取市、北栄町は並、湯梨浜町はやや少ない。
- (3) ツヤアオカメムシの誘殺数は、平年比で北栄町はやや多く、鳥取市は並、八頭町、湯梨浜町はやや少ない。
- (4) 8月上旬現在、県予察ほ場（園芸試験場、無袋・殺虫剤無散布、ゴールド二十世紀）におけるカメムシ類の飛来は未確認。また、園芸試験場の防風樹であるサンゴジュの実へのカメムシ類の飛来も未確認である。