

平成30年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒星病

平成31年2月18日
鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒星病の腋花芽における病芽率（2018）

地 区 名		品 種	花芽数	病芽数	病 芽 率（％）		
					本 年	前 年	平 年
東 部	鳥取市1	豊 水	84	3	3.6	15.1	3.8
		幸 水	161	1	0.6	0	1.6
	鳥取市2 佐治町	新甘泉	188	0	0	2.7	— ^{a)}
		豊 水	135	2	1.5	1.2	2.7
	鳥取市3 青谷町	豊 水	150	3	2.0	0.7	1.0
	八頭町（八東）	豊 水	171	6	3.5	4.1	3.0
中 部	湯梨浜町（東郷）	新甘泉	61	0	0	7.4	— ^{b)}
	倉吉市	新甘泉	48	0	0	0	— ^{d)}
		幸 水	86	0	0	0	0.2
	北栄町（大栄）	新甘泉	93	0	0	0	— ^{c)}
		幸 水	104	0	0	0	0.7
	琴浦町 ^{e)} （東伯）	新甘泉	115	2	1.7	(0) ^{e)}	— ^{d)}
西 部	大山町1（中山）	新甘泉	60	1	1.7	0	— ^{b)}
	大山町2（名和）	新甘泉	147	0	0	0.6	— ^{b)}
平 均		—	114.5	1.3	1.0	2.3	1.9

枝の採集日：平成31年1月11日～1月29日（新梢を採集し、7日以上室温に置いた後調査）

調査日：平成31年1月18日～2月4日

平 年：平成21年～30年

- a) 平成27年度に調査地点を変更しているため、平年値は未記載。
- b) 平成26年度に調査地点および品種を変更しているため、平年値は未記載。
- c) 平成28年度に調査地点を変更しているため、前年値および平年値は未記載。
- d) 平成29年度に調査品種を変更しているため、前年値および平年値は未記載。
- e) 調査園が例年と異なるため参考値とする。

<要約>

- ・本年のナシ黒星病の芽りん片における病芽率は、平年に比べてやや低かった。
- ・昨年発生の多かった園では芽基部病斑に注意し、見つけ次第基部から切除する。