

平成 2 9 年度病虫害発生予察指導情報
対象病虫害：ナシ黒斑病

平成 2 9 年 5 月 1 1 日
鳥取県病虫害防除所

表 1 ナシ黒斑病の果実における発病率（平成29年）

地 区	ポリ袋検定法による			被 袋 果 実 の 発 病 率 (%)					
	幼果の発病率 ¹⁾ (%)			6 月			7 月		
	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	1.7	1.6	0.3 ³⁾						
鳥取市 2	3.5	5.6	1.1						
鳥取市 3	4.2	8.0	7.8						
八頭町	1.7	0	0.5						
湯梨浜町 1	0	0	0.4						
湯梨浜町 2	2.6	0	0.7						
倉吉市	2.5	0	0.7						
園 試	1.7	0	3.3						
琴浦町	0.8	0	0.6						
大山町 1	3.3	0	0.8						
大山町 2	4.5	0	1.3						
南部町	0.9	0	0.5						
平均	2.3	1.3	1.5						

(注)

¹⁾ 1 園当り 100～120 果について調査(試料採取：4 月 2 9 日、5 月 1 日、採集後 2 3℃ に 3 日間静置後、発病率調査)

²⁾ 平成 1 9～2 8 年の平均値

³⁾ 平成 2 2～2 8 年の平均値

<要約>

幼果の平均発病率は 2. 3 % (平年：1. 5 %) であり平年並の発生量であったが、発生地点数は多い傾向であった。