

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.3)

平成29年5月29日
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4・上	0	0.0			0	0.0	0	0.0
・中	0	0.0			0	0.1	0	0.0
・下	4	1.1			2	0.3	10	0.5
5・上	29	20.2	8	2.6	30	5.4	6	4.2
・中	22	25.8	9	8.4	25	9.3	20	14.6
・下		50.0		24.0		26.8		19.3

*平年：H19～28

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4・上	1	0.0			0	0.0	0	0.0
・中	0	0.2			0	0.0	0	0.0
・下	0	0.5			0	0.4	0	0.0
5・上	8	2.0	1	2.1	5	0.3	0	0.2
・中	2	1.4	0	1.9	0	0.0	0	0.5
・下		4.4		2.4		0.6		0.4

*平年：H19～28

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4・上	0	0.0			0	0.0	0	0.0
・中	0	0.0			0	0.0	0	0.0
・下	0	0.1			0	0.0	0	0.0
5・上	1	0.4	0	0.2	1	0.1	3	0.3
・中	2	1.0	1	1.6	2	0.9	2	2.8
・下		3.2		4.3		5.8		8.1

*平年：H19～28

表2 集合フェロモントラップ^{*}におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町		北栄町		米子市	南部町
	本年	平年 ^{**}	本年	平年 ^{**}	本年	本年
4・上	0	0.0	0	0.2	0	0
・中	0	0.1	0	0.5	0	0
・下	5	1.2	47	4.0	2	0
5・上	4	15.8	53	17.0	0	1
・中	4	10.7	41	13.6	1	0
・下		9.6		13.0		

* …八頭町（水盤式）は水田畦畔、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所選果場、南部町（乾式）は会見選果場に設置。米子市及び南部町は本年度から調査開始（西部農業改良普及所調査）。

** …平年：H19～28

<1 情報の内容 5月中旬現在 >

- （1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、湯梨浜町及び北栄町はやや多く、鳥取市及び八頭町は平年並。また、集合フェロモントラップの誘殺数は、北栄町は多く、八頭町はやや少。
- （2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数はほぼ平年並。
- （3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数はほぼ平年並。