

平成29年病虫害発生予察指導情報

対象病虫害：ナシ黒星病

平成29年6月20日

鳥取県病虫害防除所

表1 ナシ黒星病巡回調査結果（6月14、15、18日調査）

地 区 名		発病葉率（％）		発病果率（％）	
		本年	平年 ¹⁾	本年	平年 ¹⁾
東 部	鳥取市①	0	2.5	0	0.2
	鳥取市②	0	0.3	0.3	0.0
	鳥取市③	0.6	0	0.3	－ ²⁾
	鳥取市④	0	0.1	0	0.1
	八頭町	0	1.7	－ ²⁾	0.3
中 部	湯梨浜町	0	0	0	0
	倉吉市①	0	0.1	0	0
	倉吉市②	0.6	0.8	1.0	0.7
	北栄町	0	0.4	0	0.0
	琴浦町	0	0.2	0	0
西 部	大山町	0	2.9	0.3	0.2
	米子市	0	0.8	－ ²⁾	0.2
	南部町	0	0	0	0
平 均		0.1	0.8	0.2	0.1

注) 1) 調査地点により調査年数が異なるため、H19～28年の期間のうち2年以上（最大10年）の調査結果をもとに平年値を算出した。

2) 大袋掛け実施後で調査ができなかった。

・ 1圃場当たり300果、30果そうの全葉を調査

【概要】・果そう葉における発病葉率は、平年に比べてやや低かった。

・果実における発病果率は、平年並であった。

【対策】・発病した葉及び果実は取り除き、園外で処分する。

・多発園では、E B I 剤（アンビルフロアブル、スコア顆粒水和剤など）の追加防除を行う。E B I 剤の散布時には、耐性菌の発達を避けるためチウラム水和剤、ベルクトフロアブルなどの殺菌剤を混用することが望ましい。