

病害虫発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No. 9)

平成29年7月25日
鳥取県病害虫防除所

表1 - 1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	4	1.2			2	0.4	10	0.5
5月計	86	86.0	31	35.0	76	41.4	43	38.1
6・上	1	29.7	4	12.4	4	17.3	8	18.5
・中	14	72.4	2	49.0	11	42.3	31	33.5
・下	21	109.6	34	61.1	22	58.9	22	52.0
7・上	367	283.9	82	92.5	167	90.9	246	119.6
・中	209	457.8	71	175.8	52	90.6	65	126.4
・下		455.8		300.7		91.9		115.8

*平年：H19～28

表1 - 2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	1	0.7			0	0.4	0	0.0
5月計	22	7.8	4	6.4	6	1.0	0	1.1
6・上	5	9.7	2	1.9	0	2.1	0	0.4
・中	5	20.7	0	5.2	0	1.4	2	1.4
・下	15	25.7	1	4.9	4	4.9	0	3.5
7・上	252	75.9	53	15.1	50	10.1	37	7.1
・中	405	214.7	128	57.8	52	19.8	23	26.5
・下		423.5		182.4		53.9		63.2

*平年：H19～28

表1 - 3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.1			0	0.0	0	0.0
5月計	6	4.6	1	6.1	5	6.8	8	11.2
6・上	1	8.2	0	5.2	3	13.6	4	12.4
・中	1	50.5	3	33.0	6	28.4	7	53.6
・下	5	105.3	7	68.0	6	72.7	36	124.9
7・上	21	147.7	23	87.4	46	80.9	25	139.8
・中	25	385.7	13	98.0	14	69.5	13	75.7
・下		335.2		97.9		75.8		40.5

*平年：H19～28

表2 集合フェロモントラップ*におけるチャバネオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		北栄町		米子市	南部町
	本年	平年**	本年	平年**	本年	本年
4月計	5	1.3	47	4.7	2	0
5月計	12	36.1	104	43.7	2	1
6・上	0	39.3	16	23.3	1	0
・中	0	29.2	8	18.5	1	0
・下	3	48.8	26	11.5	6	0
7・上	92	267.1	96	27.8	6	2
・中	67	345.6	25	33.5	1	0
・下		332.4		24.8		

* ...八頭町(水盤式)は水田畦畔、北栄町(水盤式)は果樹園横、米子市(乾式)は別所選果場、南部町(乾式)は会見選果場に設置。米子市及び南部町は本年度から調査開始(西部農業改良普及所調査)

** ...平年: H19~28

< 1 情報の内容 7月中旬現在 病害虫発生予察注意報第1号発表(7月13日付) >

- (1) チャバネオカメムシの誘殺数はほぼ平年並。
- (2) クサギカメムシの誘殺数は平年比やや多い。
- (3) ツヤアオカメムシの誘殺数は平年比やや少ない。
- (4) 7月中旬現在、県予察ほ場(園芸試験場、無袋・殺虫剤無散布、ゴールド二十世紀)におけるカメムシ類の飛来は未確認。また、7月第4半旬現在、園芸試験場の防風樹であるサンゴジュの実へのカメムシ類の飛来は未確認。