

ナシ・ハダニ類発生状況調査結果

平成29年7月25日
鳥取県病害虫防除所

寄生葉率(%)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本 年	前 年	平 年*	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
鳥取市佐治町	0	0	16.3	13.3	45.0	8.7	0	0	1.8
鳥取市青谷町	0	0	1.0	0	25.0	4.2	0	0	0.0
八頭町	0	0	7.3	0	0	2.2	0	0	0.7
倉吉市	0	0	0.2	0	0	0.0	0	1.7	0.2
湯梨浜町別所	0	0	5.3	5.0	16.7	4.3	0	0	4.8
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	0	0	11.3	0	0	6.2	0	0	0.0
大山町坪田	91.7	0	0.2	3.3	0	0.0	0	0	0.0
南部町	0	0	0.3	0	0	0.0	0	0	0.0
平 均	10.2	0	5.8	2.4	9.6	2.8	0	0.2	0.8

* 平年値:平成19～28年

** 平年値:平成22～28年

10葉当たり寄生頭数(頭/10葉)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
鳥取市佐治町	0	0	5.1	2.2	8.5	1.6	0	0	0.5
鳥取市青谷町	0	0	0.1	0	2.8	0.6	0	0	0.0
八頭町	0	0	9.1	0	0	0.2	0	0	0.2
倉吉市	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.5	0.1
湯梨浜町別所	0	0	0.8	0.5	2.5	0.7	0	0	1.1
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	0	0	2.9	0	0	2.1	0	0	0.0
大山町坪田	79.7	0	0.0	1.2	0	0.0	0	0	0.0
南部町	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
平 均	8.9	0	2.0	0.4	1.5	0.6	0	0.1	0.2

* 平年値:平成19～28年

** 平年値:平成22～28年

(概要)

・調査は7月24日に実施。調査地点は黒斑病と共通。

・ハダニ類の発生量は、ほぼ平年並で、前年と比較してやや少ない。

〔クワオオハダニ〕 前年比:並、平年比:少ない(ただし、大山町を除く)

〔カンザワハダニ〕 前年比:やや少、平年比:並

〔ナミハダニ〕 前年比:並、平年比:やや少