

平成29年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：イネ・いもち病（No. 6）

平成29年8月10日
鳥取県病害虫防除所

1 情報の内容

中生品種が出穂を迎える時期となっている。穂いもちの伝染源となる葉いもちの広域発生は認められていない。しかし、平年に比べ晴れの日が少ないと予想されているため、今後の穂ばらみ期及び穂揃い期の防除を徹底する必要がある。

2 発生状況等

- (1) 8月7日現在、県全体の発生ほ場率は6.7%（平年：22.4%）と平年より少ない。
- (2) 穂肥の施用により葉色が濃くなり、いもち病の感受性が高まっている。
- (3) ブラストム（いもち病予察システム）による葉いもちの感染好適条件又は準感染好適条件は、8月1～9日において出現しなかった（表1）。
- (4) 8月10日発表の向こう1ヶ月の気象予報によると、平年に比べ晴れの日が少ないと予想されているため、穂ばらみ期及び穂揃い期の防除を徹底する必要がある。

表1 ブラストムによる感染好適日の出現状況

日付	鳥取	湖山	青谷	岩井	智頭	倉吉	塩津	米子	境	茶屋
8/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) ●感染好適日、○準感染好適日

3 防除上注意すべき事項

- (1) 葉いもちは穂いもちの伝染源となるため、葉いもちの進展が止まっていないほ場では、治療効果を有する粉剤、水和剤などを用いて葉いもち防除を行う。なお、平坦部のほ場においても、葉いもちの進展が止まっていない場合は同様の対応を行う。
- (2) 穂いもちは発生後の防除が困難であるため、穂ばらみ期及び穂揃い期の2回、粉剤、水和剤等による防除を徹底する。なお、降雨が続く場合は、雨の止み間をみて防除を行う。この場合、散布後から降雨が3時間程度なければ、防除効果は十分にある。
- (3) まだ出穂していないほ場で、穂いもち防除を目的として粒剤を使用する場合は、各薬剤の使用基準を確認して、出穂前の所定の時期に湛水散布する。この

際、農薬のラベルに記載されている止水に関する注意事項等を確認するとともに、止水期間を1週間程度とする。また、農薬の流出を防止するために必要な措置を講じるように努める。

- (4) 上位葉における発病が多く、穂いもちの多発生が予想される場合は、傾穂期（穂揃い期の7～10日後）の防除を追加する。
- (5) 「コシヒカリ」、「ひとめぼれ」、「きぬむすめ」などのいもち病に弱い品種の栽培、窒素肥料の多施用、遅植えなどの条件では特に発生しやすい。
- (6) 本県では、ストロビルリン系薬剤耐性菌が発生しているため、本系統薬剤の使用を控えることを基本とし他系統の薬剤を使用する。
- (7) 防除に当たっては、農薬の使用基準を遵守するとともに、使用上の注意事項を守り、散布作業者の安全の確保に努める。特に、葉いもちの追加防除を行ったほ場では、農薬の総使用回数を超えないよう十分注意して穂いもちの防除薬剤を選択する。