

## 平成 29 年度病虫害発生予報第 4 号

平成 29 年 6 月 7 日  
鳥取県病虫害防除所

### 予報の概要

区 分	農作物名	病 害 虫 名	発生時期	予想発生量
普通作物	イ ネ	いもち病（葉いもち） 縞葉枯病（ヒメトビウンカ） イネミズゾウムシ	平 年 並 早 い －	平 年 並 やや多い 少ない
果 樹	ナ シ	黒斑病 黒星病 輪紋病 アブラムシ類 ニセナシサビダニ シンクイムシ類	平 年 並 － 平 年 並 平 年 並 平 年 並 平 年 並	平 年 並 平 年 並 平 年 並 やや多い やや多い 平 年 並
	カ キ	落葉病 炭疽病 カキノヘタムシガ	平 年 並 平 年 並 平 年 並	平 年 並 やや多い 平 年 並
	ブドウ	べと病 チャノキイロアザミウマ ハマキムシ類（チャノコカクモンハマキ）	平 年 並 平 年 並 平 年 並	平 年 並 平 年 並 やや多い
野 菜	スイカ	つる枯病、炭疽病 うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類	平 年 並 平 年 並 － －	平 年 並 平 年 並 平 年 並 平 年 並
	イチゴ （育苗期）	うどんこ病 炭疽病 アブラムシ類 ハダニ類	平 年 並 平 年 並 平 年 並 平 年 並	平 年 並 平 年 並 平 年 並 平 年 並
	ネ ギ	べと病 さび病 黒斑病 ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	－ 平 年 並 平 年 並 － 平 年 並	平 年 並 平 年 並 平 年 並 やや多い やや多い

## 気象予報（抜粋）


1 か月予報（6月3日～7月2日：6月1日、広島地方気象台発表）

向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。


平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

週別の気温は、1週目は、平年並または低い確率ともに40%です。2週目は、平年並または高い確率ともに40%です。3～4週目は、平年並または高い確率ともに40%です。

### <向こう1か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>



### <気温経過の各階級の確率(%)>



## 普通作物

### [イネ]

#### 1 いもち病（葉いもち）

##### (1) 予報の内容

発生地域	県内全域
発生時期	平年並
発生量	平年並

##### (2) 予報の根拠

ア 4月下旬以降、気温のやや高い状態が続いているが、現地点では苗いもちの発生は確認されていない。

イ 長期効果持続型の育苗箱施用剤が広く普及している。

ウ 向こう3か月の気象予報によると、6月～7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多く、7月後半は平年と同様に晴れの日が多いと予想されていることから、葉いもちの発生時期及び発生量は平年並と見込まれる。

##### (3) 防除上注意すべき事項

ア 移植後は、ほ場をよく観察して本病の早期発見に努める。急性型病斑がみられた場合は、病害虫防除指針などを参考にして、直ちに治療効果のある粉剤、水和剤などにより防除を行う。

イ 「コシヒカリ」、「ひとめぼれ」、「きぬむすめ」などの本病に弱い品種の栽培、窒素肥料の多施用、遅植えなどの条件では特に発生しやすいため、注意する。

ウ 育苗箱施用剤を使用しても十分な効果が得られない場合があるため、ほ場の見回りなどを行い、本病の早期発見に努める。

エ 補植用置き苗は、本田における発生源となることが多いため、速やかに処分

する。

オ 本県では、ストロビルリン系薬剤耐性菌が発生しているため、本系統薬剤の使用を控えることを基本とし、他系統の薬剤を使用する。

## 2 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

### （1）予報の内容

発生地域 県内全域  
発生時期 早 い  
発生量 やや多い

### （2）予報の根拠

ア これまでの気温の推移及び向こう1か月の気象予報から、本病原ウイルスを媒介するヒメトビウンカ第2世代幼虫のふ化最盛期は平年より早い6月第4～5半旬になると見込まれる。

イ 前年の縞葉枯病及びヒメトビウンカの発生は多かった。

ウ 本種に登録のある育苗箱施用剤が広域で普及している。

エ これまでの気象経過、向こう1か月の気象予報から、本病の発生量はやや多いと予想される。

### （3）防除上注意すべき事項

ア 本病の常発地で、ヒメトビウンカに登録のある育苗箱施用剤を使用していない場合には、第2世代幼虫のふ化最盛期に、粉剤、粒剤などを散布する。使用薬剤については、病害虫防除指針などを参考とする。

イ ヒメトビウンカはイネの葉色が濃いほ場に発生しやすいので、窒素過多にならないよう注意する。

## 3 イネミズゾウムシ

### （1）予報の内容

発生地域 県内全域  
発生量 少 ない

### （2）予報の根拠

5月第5半旬現在、予察灯への誘殺は確認されていない。

### （3）防除上注意すべき事項

ア 育苗箱施用剤による防除を行っていても本田での食害が急増する場合には、病害虫防除指針等を参考にして、追加防除を行う。

イ 直播栽培などの育苗箱施用剤を使用していない水田において、被害葉が顕著に増加し、成虫密度が1株当たり0.5頭以上になった場合は、病害虫防除指針等を参考にして、粒剤などで防除を行う。

## 果 樹

### [ナ シ]

## 1 黒斑病

### （1）予報の内容

発生時期 平 年 並  
発生量 平 年 並

### （2）予報の根拠

ア 本病の越冬伝染源は平年並～やや多かった。

イ 県予察ほ場における開花期以降の胞子飛散数は、ほぼ平年並に推移している。

ウ 4月下旬～5月上旬に行った県内12園の巡回調査によると、幼果のポリ袋検定法による発病果率は2.3%（平年：1.5%）と平年並であった。

エ 向こう1か月の気象予報から、発生時期は平年並、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 今後は新梢葉が多くなり、薬液の付着むらが出やすいので、新梢の先端まで薬液が十分かかるよう注意する。

イ 薬剤はチウラム水和剤（トレノックスフロアブル又はチオノックフロアブル）500倍とポリオキシソールAL水和剤1，500倍の混用液、アントラコール顆粒水和剤500倍液、ナリアWDG2，000倍液などを使用する。

ウ 園内の風通しをよくするため、下草の管理を徹底する。

## 2 黒星病

(1) 予報の内容

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 県予察ほ場における開花期以後の胞子飛散数は、一部の期間（5月第6半旬）を除いてほぼ平年並に推移した。

イ 5月上旬に行った県内13園の巡回調査によると、葉における平均発病葉率は0.1%（平年：0.2%）と平年に比べてやや低く、幼果における平均発病果率は0.2%（平年：0.2%）と平年並であった。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病した葉や幼果は取り除き、園外に持ち出し処分する。

イ 赤ナシの有袋栽培では、袋掛け直前に必ず薬剤散布を行う。

ウ 薬剤はアントラコール顆粒水和剤500倍液、ベルコートフロアブル1，500倍液、ファンタジスタ顆粒水和剤4，000倍液、オキシラン水和剤600倍液、ナリアWDG2，000倍液などを使用する。

エ 現在発生が認められる園では、防除効果の高いEBI剤（アンビルフロアブル1，500倍液、スコア顆粒水和剤4，000倍液など）を追加散布する。

オ EBI剤の散布にあたっては、薬剤耐性菌の発生を回避するため、EBI剤以外の薬剤との輪番散布とする。

カ 降雨が多い場合は、薬剤散布間隔が空き過ぎないように注意する。

## 3 輪紋病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 昨年の発生量は平年に比べてやや多かった。

イ 本病の発生は気象条件の影響が大きく、年次による発生量の差が大きい。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 袋掛けが遅れると発生が増加するので、摘果が終わり次第、早めに袋掛けを行う。

イ 袋かけ前の防除から袋かけ終了までの期間をできるだけ短くする。

ウ 果実及び枝の発病を抑えるため、梅雨期の薬剤散布を徹底する。

エ 薬剤はオキシラン水和剤600倍液、ナリアWDG2，000倍液などを使用する。

#### 4 アブラムシ類

##### (1) 予報の内容

発生時期 平年並  
発生量 やや多い

##### (2) 予報の根拠

ア 5月第6半旬現在、県予察ほ場（園芸試験場）におけるワタアブラムシの寄生新梢率は40.9%（平年：17.0%）で平年と比べてやや高く、ユキヤナギアブラムシの寄生新梢率は65.6%（平年：20.1%）で平年と比べて高い。

イ 5月16日の巡回調査の結果、アブラムシ類の発生量はほぼ平年並であった。

ウ 向こう1か月の気象予報から、アブラムシ類の発生時期は平年並、発生量はやや多いと予想される。

##### (3) 防除上注意すべき事項

発生が多いほ場では、アドマイヤーフロアブル5,000倍液またはウララDF4,000倍液などを散布する。

#### 5 ニセナシサビダニ

##### (1) 予報の内容

発生時期 平年並  
発生量 やや多い

##### (2) 予報の根拠

ア 6月上旬現在、県予察ほ場におけるニセナシサビダニの新梢先端葉1枚当たりの寄生個体数は340.8頭（平年：370.0頭）で平年並の発生量となっている。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生盛期は平年並の6月中下旬頃、発生量はやや多いと予想される。

##### (3) 防除上注意すべき事項

ア 第1回目の防除は発生初期の5月下旬頃、第2回目の防除は発生盛期の6月中旬頃を目安に実施する。

イ 薬剤はダニトロンフロアブル1,500倍液、コテツフロアブル3,000倍液、ハチハチフロアブル2,000倍液などを使用し、ニセナシサビダニが寄生している新梢先端部に薬液が十分付着するように散布する。

#### 6 シンクイムシ類

##### (1) 予報の内容

発生時期 平年並  
発生量 平年並

##### (2) 予報の根拠

ア ナシヒメシンクイの越冬世代成虫（第1回成虫）の現地予察ほ場（湯梨浜町）における発生盛期は、ほぼ平年並であった。

イ 現地9地点で調査しているフェロモントラップの誘殺数は、ナシヒメシンクイで平年並～やや少ない。

ウ 向こう1か月の気象予報から、ナシヒメシンクイの第1世代成虫（第2回成虫）の発生盛期は平年並の6月中旬頃と予想される。

##### (3) 防除上注意すべき事項

ア 授粉樹に残っている果実など（裸果）はシンクイムシ類の発生源となるので早急に除去する。

イ 防除暦を参考に定期的な防除を行う。

## [カ キ]

### 1 落葉病

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 昨年の本病の発生量は平年並であったため、越冬菌密度についても平年並であると見込まれる。

イ 本病は連続降雨により発病が助長される。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

薬剤は、落花始め～生理落果期に、有機銅水和剤（キノンドーフロアブル又はドキリンフロアブル）1,000倍液、デランフロアブル2,000倍液、マンゼブ水和剤（ジマンダイセン水和剤又はペンコゼブ水和剤）の600倍液などを10日間隔でそれぞれ1回ずつ散布する。

### 2 炭疽病

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 やや多い

#### (2) 予報の根拠

ア 昨年の発生量は平年に比べてやや多かった。

イ 本病は一旦菌密度が高まると、多発生が続く傾向である。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生量はやや多いと予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア 新梢における発病を徹底して防ぐことが、果実被害を防ぐ上で重要となる。

イ 開花期～新梢停止期（6月上旬～7月中旬頃）は重点防除時期となるので、防除間隔が空き過ぎないように注意する。

ウ 発病部位は見つけ次第切除し、園外に持ち出し処分する。

エ 薬剤は、有機銅水和剤（キノンドーフロアブル又はドキリンフロアブル）1,000倍液、デランフロアブルの2,000倍液、マンゼブ水和剤（ジマンダイセン水和剤またはペンコゼブ水和剤）の600倍液などを使用する。

### 3 カキノヘタムシガ

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月25日現在、県予察ほ場（河原試験地）では、予察灯への誘殺は確認されていない。

イ 向こう1か月の気象予報から、成虫の発生盛期は平年並の6月上旬と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア 落葉病の防除時期に合わせてパダンSG水溶剤1,500倍液などを散布する。

イ なお、パダンSG水溶剤は、開花後に発生するチャノキイロアザミウマにも効果がある。

## [ブドウ]

### 1 ベと病

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月25日現在、県予察ほ場（砂丘地農業研究センター）では、本病の発生は確認されていない。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア 本病は連続降雨により発病が助長され、施設栽培ではハウスの谷部など雨に当たりやすい場所や多かん水園での発生が多い。

イ 果粒が大豆大以上になると薬剤散布によって果粉が溶脱するので、果粒が小豆大までに新梢先端や副梢に十分量散布する。薬剤はランマンフロアブル2,000倍液、ベトファイター顆粒水和剤3,000倍液などを輪番散布する。

### 2 チャノキイロアザミウマ

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月中旬現在、県予察ほ場（砂丘地農業研究センター）の黄色粘着トラップによる本種の誘殺数は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生が増加する時期は、平年並の6月上～中旬頃と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

例年発生の多い園では、モスピラン顆粒水溶剤4,000倍液、バリアード顆粒水和剤4,000倍液などを6月上旬から中旬に必ず散布する。ただし、果実に直接かかると果粉が溶脱する恐れがあるため、果房にかからないようにする。

### 3 ハマキムシ類（チャノココクモンハマキ）

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 やや多い

#### (2) 予報の根拠

ア 県予察ほ場（砂丘地農業研究センター）の性フェロモントラップ調査では、チャノココクモンハマキ越冬世代成虫の誘殺数はやや多い。

イ 向こう1か月の気象予報から、第1世代成虫（第2回成虫）の発生盛期は平年並の6月下旬頃と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア チャノココクモンハマキの発生が多い園では、サムコルフロアブル10の5,000倍液などを散布する。

イ 防風樹のサンゴジュは本種の発生源となるので注意する。

# 野 菜

## [スイカ]

### 1 つる枯病、炭疽病

#### (1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発生量 平 年 並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場におけるつる枯病の発生は平年並であり、炭疽病の発生は認められていない。

イ 本病は降雨によって発病が助長される。向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア トンネル内が過湿にならないようにこまめに換気を行う。

イ 雨滴のあたる箇所や株元から発病しやすいので、雨がなるべくあたらないようにトンネルの開閉を行う。また、薬剤散布は株元にも薬液がよくかかるように丁寧に行う。

ウ 雨の日が続くと発病が増加するので、散布間隔を短くし、雨の止み間に防除する。

エ 防除薬剤は、ジマンダイセン水和剤600倍液、アントラコール顆粒水和剤600倍液、ダコニール1000の700倍液などを散布する。

### 2 うどんこ病

#### (1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発生量 平 年 並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場において、本病の発生は認められていない。

イ 本病は、25℃前後の気温と乾燥条件で発病が助長される。向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

すでに発病のみられるほ場では、トリフミン水和剤5,000倍液、ガッテン乳剤5,000倍液などを散布する。つる枯病も同時に発生している場合にはポリベリン水和剤1,000倍液を散布する。

### 3 アブラムシ類

#### (1) 予報の内容

発生量 平 年 並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場におけるアブラムシ類の発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、アブラムシ類の発生量は平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア ハウスの換気部分や出入口には防虫ネット被覆を行い、アブラムシ類の侵入防止に努める。

イ ハウス栽培で収穫間近なものは、モスピラン顆粒水溶剤2,000倍液を散布する。トンネル栽培では、肥大中期にはコルト顆粒水和剤4,000倍液、収穫前にはハチハチフロアブル1,000倍液などを散布する。

### 4 ハダニ類

#### (1) 予報の内容

発生量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場におけるハダニ類の発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

発生初期にバロックフロアブル2,000倍液を散布する。その後も発生がみられた場合はマイトコーネフロアブル1,000倍液、ダニサラバフロアブル1,000倍液などを散布し、多発した場合にはコロマイト乳剤1,000倍液を散布する。

[イチゴ(育苗期)]

1 うどんこ病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場の育苗床において本病の発生は認められていない。

イ 本病は気温が20℃前後のやや低温条件で発病が助長される。向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 本ほ場に病原菌を持ち込まないために、特に6～7月の育苗期間中の防除を徹底する。

イ 防除にあたっては、葉裏へも薬剤が付着するように丁寧に散布を行う。

ウ 発病初期まではベルコート水和剤1,000倍液などを散布する。すでに発病している場合には、カリグリーン800～1,000倍液と、トリフミン水和剤5,000倍液を混用散布する。

2 炭疽病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場の一部の育苗床において、本病の発病が認められた。

イ 本病は高温多雨で発病しやすい。向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 育苗期間中、罹病性品種については、下記の薬剤を定期的に散布する。下葉かきによる傷口、ランナーの切り口などからも感染するため、下葉かきの直後にも薬剤散布を行う。育苗初期の防除を徹底し、発病株は除去する。なお、薬剤散布にあたってはクラウン部分、葉柄、托葉、ランナーにも薬液が付着するように丁寧に散布する。

イ 育苗初期は、アミスター20フロアブル2,000倍液、ゲッター水和剤1,000倍液などを散布する。なお、アミスター20フロアブルは薬害が出やすいため、展着剤を加用しない。

ウ その後の散布薬剤は、ベルコート水和剤1,000倍液、デランフロアブル1,000倍液、アントラコール顆粒水和剤500倍液、ジマンダイセン水和剤600倍液などを用いて、7～10日間隔で予防散布する。

### 3 アブラムシ類

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場の育苗床におけるアブラムシ類の発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

防除薬剤は、ベストガード水溶剤2,000倍液、アーデント水和剤1,000倍液、サンヨール500倍液などを散布する。

### 4 ハダニ類

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場の育苗床におけるハダニ類の発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

発生初期にサンヨール500倍液、アーデント水和剤1,000倍液、コテツフロアブル2,000倍液などを散布する。発生量が多い場合はコロマイト乳剤1,000～1,500倍液（親株床での登録）などを散布する。

## [ネギ]

### 1 ベと病

#### (1) 予報の内容

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、県西部の現地調査ほ場の発生量は平年並である。

イ 本病は、15～20℃程度の気温で降雨が続くと発病が増加するが、向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア 発病後のまん延は早いので発病前からの防除に努める。

イ 発病が認められていないほ場では、ランマンフロアブル2,000倍液、アリエッティ水和剤800倍液、ペンコゼブフロアブル600倍液などを予防散布する。

ウ 発病が認められたほ場は直ちに、リドミルゴールドMZ1,000倍液、フォリオゴールド1,000倍液、レーバスフロアブル2,000倍液、フェスティバルC水和剤1,000倍液、ベネセット水和剤750倍液、ダイナモ顆粒水和剤2,000倍液などを散布する。

エ 同一成分を含む薬剤は連用しない。また、成分ごとの総使用回数に注意して薬剤を選定する。

### 2 さび病

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場における本病の発生時期は平年並であり、発生

量はやや少ない。

イ 本病は比較的低温で降雨が多い場合、発病が助長される。向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 6月に収穫する作型で、発病の多いほ場では、アミスター20フロアブル2,000倍液を散布する。

イ 7月以降に収穫する作型では、6月上旬からオンリーワンフロアブル1,000倍液、ラリー乳剤4,000倍液などを散布する。

### 3 黒斑病

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場における本病の発生量はやや少ない。

イ 本病は気温が25℃前後で、降雨が多い場合、発病が助長される。向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 根傷みや肥料不足になると発病しやすいので、排水対策を実施し、肥培管理に注意する。

イ 防除薬剤は、ポリベリン水和剤1,500倍液、ロブラール水和剤1,000倍液などを散布する。

### 4 ネギアザミウマ

(1) 予報の内容

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場における本種の発生量はやや多い。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量は引き続きやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 育苗期後半から定植当日には以下のいずれかの処理を行う。ベリマークSC400倍液などのセルトレイ灌注、定植前日から定植時には、ジノテフラン水溶剤（アルバリン顆粒水溶剤又はスタークル顆粒水溶剤）50倍液などのセルトレイ灌注、定植時には、ジノテフラン粒剤（アルバリン粒剤又はスタークル粒剤）6kg/10aなどの株元散布。

イ 土寄せ時にはダントツ粒剤6kg/10aの株元散布又はベストガード粒剤6kg/10aの株元処理を行う。

ウ 散布剤はハチハチ乳剤1,000倍液、ディアナSC2,500～5,000倍液などを散布する。

### 5 ネギハモグリバエ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 5月下旬現在、現地調査ほ場における本種の発生量はやや多い。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量は引き続きやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 育苗期後半から定植当日には以下のいずれかの処理を行う。ベリマークSC400倍液などのセルトレイ灌注、定植前日から定植時には、ジノテフラン水溶剤（アルバリン顆粒水溶剤又はスタークル顆粒水溶剤）50倍液などのセルトレイ灌注、定植時には、ジノテフラン粒剤

- (アルバリン粒剤又はスタークル粒剤) 6 kg/10 a などの株元散布。
- イ 土寄せ時にはダントツ粒剤 6 kg/10 a の株元散布又はベストガード粒剤 6 kg/10 a の株元処理を行う。
- ウ 散布剤はアグロスリン乳剤 2,000 倍液、ディアナ SC 2,500 ~ 5,000 倍液などを散布する。

[おしらせ]

**農薬の使用に当たっては、農薬使用基準を遵守するとともに、周辺への飛散には十分注意しましょう。**

農薬の詳しい登録内容は、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターの「農薬登録情報検索システム」から検索できます。( <http://www.famic.go.jp/> )

なお、農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ず御確認ください。

<鳥取県病虫害防除所ホームページ>

アドレス <http://www.jpnpn.ne.jp/tottori/>

病虫害発生予察情報、フェロモントラップ調査結果（ナシのシンクイムシ類）などの参考情報、病虫害の診断方法などの情報をお知らせしていますので、ご利用下さい。

<お問い合わせ>

普通作物関係：〒680-1142 鳥取市橋本 260

鳥取県病虫害防除所

(TEL：0857-53-1345、E-mail：boujyot@titan.ocn.ne.jp)

もしくは

鳥取県農業試験場環境研究室

(TEL：0857-53-0721、FAX：0857-53-0723)

果樹・野菜・花き関係

〒689-2221 東伯郡北栄町由良宿 2048

鳥取県園芸試験場環境研究室

(TEL：0858-37-4211、FAX：0858-37-4822)

※ 予報第5号の発表は、7月5日（水）の予定です。