

平成27年度病害虫発生予察指導情報 対象病害虫：ナシ黒斑病

平成27年6月24日
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成27年)

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 ¹⁾ (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	0.4	1.0	— ³⁾						
鳥取市 2	0	0.4	0.3						
鳥取市 3	4.8	7.7	3.1						
八頭町	0.4	0	0.4						
湯梨浜町 1	0	0	0.3						
湯梨浜町 2	0	0	0.8						
倉吉市	0	0.5	0.6						
園 試	0	2.7	2.0						
琴浦町 竹ノ内	0	0	0.3						
大山町 1 中山	0	0.5	0.2						
大山町 2 名和	0	0	0.7						
南部町	0	0	0.4						
平 均	0.5	1.1	0.8						

(注)

¹⁾ 1園当たり10新梢について全葉数及び病葉数を調査

²⁾ 平成17～26年の平均値

³⁾ 調査地点を変更したためデータ無し

<要約>

6月17、18日の調査では、新梢葉における発病率は0.5%（平年0.8%）であり、ほぼ平年並の発生量であった。

<対策>

今後、発病の多い園では、降雨が多い場合には慣行防除に加えて追加防除を実施する。防除薬剤には、有機銅水和剤（キノンドーフロアブル、ドキリンフロアブル）、アリエッティC水和剤、ベルクトフロアブルなどがある。

平成 27 年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病

平成 27 年 6 月 24 日
鳥取県病害虫防除所

表 1 ナシ黒斑病の果実における発病率（平成 27 年）

地 区	ポリ袋検定法による			被 袋 果 実 の 発 病 率 ²⁾ (%)					
	幼果の発病率 ¹⁾ (%)			6 月			7 月		
	本 年	前 年	平 年 ³⁾	本 年	前 年	平 年 ³⁾	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	0.8	0	— ⁴⁾	0	0	— ⁴⁾			
鳥取市 2	0	0	1.0	1.7	0	0.2			
鳥取市 3	2.4	12.5	6.8	16.7	11.7	3.5			
八頭町	0	0	1.1	0	1.7	0.9			
湯梨浜町 1	0	0	0.5	0	0	0.2			
湯梨浜町 2	0	0	0.9	0	0	0			
倉吉市	0	0	0.9	0	0	0.4			
園 試	0.8	— ⁵⁾	3.6	0	3.3	2.6			
琴浦町	0	0	1.0	0	0	0.2			
大山町 1	0	0	1.1	0	1.7	0.2			
大山町 2	0.8	— ⁵⁾	1.7	0	1.7	0.4			
南部町	0	0.8	0.7	0	0	0			
平均	0.4	1.3	1.8	1.5	1.7	0.8			

(注)

¹⁾ 1 園当り 120～126 果について調査(試料採取：4 月 27、28、30 日、採集後 23℃ に 3 日間静置後、発病率調査)

²⁾ 1 園当り 60 果について調査(調査日：6 月 17、18 日)

³⁾ 平成 17～26 年の平均値

⁴⁾ 調査地点を変更したためデータ無し

⁵⁾ 欠側

<要約>

被袋果実の平均発病率は、調査対象地点全体で 1.5% (平年：0.8%) であり、平年に比べやや多い発生量であった。