

ナシ・ハダニ類発生状況調査結果

平成27年7月31日
鳥取県病害虫防除所

寄生葉率(%)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本 年	前 年	平 年*	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
鳥取市佐治町	3.3	6.7	18.3	31.7	5.0	2.3	0	0	1.8
鳥取市青谷町	1.7	0	2.7	10.0	0	1.5	0	0	0.0
八頭町	1.7	0	7.3	18.3	0	0.5	5.0	0	0.2
倉吉市	0	0	0.5	0	0	0.3	0	0	0.0
湯梨浜町別所	30.0	11.7	2.8	10.0	8.3	2.2	0	1.7	4.8
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	45.0	3.3	9.5	13.3	1.7	6.3	0	0	0.0
大山町坪田	0	0	1.3	0	0	0.3	0	0	0.0
南部町	0	0	1.7	0	0	0.5	0	0	0.0
平 均	9.1	2.4	6.1	9.3	1.7	1.6	0.6	0.2	0.8

* 平年値:平成17～26年

** 平年値:平成22～26年

10葉当たり寄生頭数(頭/10葉)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
鳥取市佐治町	0.3	0.7	6.1	4.7	0.5	0.7	0	0	0.5
鳥取市青谷町	0	0	0.6	2.5	0	0.2	0	0	0.0
八頭町	0	0	9.2	2.0	0	0.1	1.3	0	0.1
倉吉市	0	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0.0
湯梨浜町別所	4.0	1.7	0.5	1.7	1.5	0.4	0	0.2	1.1
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	15.3	0.3	3.2	2.5	0.2	2.7	0	0	0.0
大山町坪田	0	0	0.4	0	0	0.1	0	0	0.0
南部町	0	0	0.4	0	0	0.1	0	0	0.0
平 均	2.2	0.3	2.3	1.5	0.2	0.5	0.1	0.0	0.2

* 平年値:平成17～26年

** 平年値:平成22～26年

(概要)

・調査は7月29日に実施。調査地点は黒斑病と共通。

・ハダニ類の発生量は、平年、前年と比較するとやや多い。

〔クワオオハダニ〕 前年比:やや多い、平年比:やや多い

〔カンザワハダニ〕 前年比:多い、平年比:やや多い

〔ナミハダニ〕 前年比:並、平年比:並