

平成 2 7 年度病害虫発生予察指導情報  
対象病害虫：ナシ黒斑病

平成 2 7 年 8 月 3 日  
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成27年)

| 地 区      | 新 梢 葉 の 発 病 率 <sup>1)</sup> (%) |     |                   |     |      |                   |     |     |     |
|----------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|------|-------------------|-----|-----|-----|
|          | 6 月                             |     |                   | 7 月 |      |                   | 9 月 |     |     |
|          | 本 年                             | 前 年 | 平 年 <sup>2)</sup> | 本 年 | 前 年  | 平 年 <sup>2)</sup> | 本 年 | 前 年 | 平 年 |
| 鳥取市 1    | 0.4                             | 1.0 | — <sup>3)</sup>   | 0.3 | 0    | — <sup>3)</sup>   |     |     |     |
| 鳥取市 2    | 0                               | 0.4 | 0.3               | 0.3 | 1.1  | 1.4               |     |     |     |
| 鳥取市 3    | 4.8                             | 7.7 | 3.1               | 8.1 | 28.8 | 10.1              |     |     |     |
| 八頭町      | 0.4                             | 0   | 0.4               | 0.3 | 0    | 1.5               |     |     |     |
| 湯梨浜町 1   | 0                               | 0   | 0.3               | 0.3 | 0.7  | 1.3               |     |     |     |
| 湯梨浜町 2   | 0                               | 0   | 0.8               | 0   | 0    | 0.3               |     |     |     |
| 倉吉市      | 0                               | 0.5 | 0.6               | 0.3 | 0.3  | 0.8               |     |     |     |
| 園 試      | 0                               | 2.7 | 2.0               | 1.2 | 19.4 | 8.7               |     |     |     |
| 琴浦町 竹ノ内  | 0                               | 0   | 0.3               | 0.9 | 0.3  | 1.5               |     |     |     |
| 大山町 1 中山 | 0                               | 0.5 | 0.2               | 0.9 | 0.7  | 2.7               |     |     |     |
| 大山町 2 名和 | 0                               | 0   | 0.7               | 1.7 | 0.3  | 2.1               |     |     |     |
| 南部町      | 0                               | 0   | 0.4               | 0   | 0.3  | 0.9               |     |     |     |
| 平 均      | 0.5                             | 1.1 | 0.8               | 1.2 | 4.3  | 2.8               |     |     |     |

(注)

<sup>1)</sup> 1 園当たり 1 0 新梢について全葉数及び病葉数を調査 (6 月：6 月 1 6、1 8 日調査、7 月：7 月 2 4、2 7、2 8、3 0 日調査)

<sup>2)</sup> 平成 1 7～2 6 年の平均値

<sup>3)</sup> 調査地点を変更したためデータ無し

<要約>

7 月 2 4～3 0 日の調査では、一部で中発生の園が認められたものの、新梢葉における発病率は 1. 2 % (平成 2. 8 %) であり、平年に比べやや少ない発生量であった。

**平成 2 7 年度病害虫発生予察指導情報**  
対象病害虫：ナシ黒斑病

平成 2 7 年 8 月 3 日  
鳥取県病害虫防除所

表 1 ナシ黒斑病の果実における発病率（平成27年）

| 地 区    | ポリ袋検定法による                |                 |                   | 被 袋 果 実 の 発 病 率 <sup>2)</sup> (%) |      |                   |      |      |                   |
|--------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------|-------------------|------|------|-------------------|
|        | 幼果の発病率 <sup>1)</sup> (%) |                 |                   | 6 月                               |      |                   | 7 月  |      |                   |
|        | 本 年                      | 前 年             | 平 年 <sup>3)</sup> | 本 年                               | 前 年  | 平 年 <sup>3)</sup> | 本 年  | 前 年  | 平 年 <sup>3)</sup> |
| 鳥取市 1  | 0.8                      | 0               | — <sup>4)</sup>   | 0                                 | 0    | — <sup>4)</sup>   | 0    | 0    | — <sup>4)</sup>   |
| 鳥取市 2  | 0                        | 0               | 1.0               | 1.7                               | 0    | 0.2               | 0    | 0    | 0.3               |
| 鳥取市 3  | 2.4                      | 12.5            | 6.8               | 16.7                              | 11.7 | 3.5               | 11.7 | 15.0 | 7.8               |
| 八頭町    | 0                        | 0               | 1.1               | 0                                 | 1.7  | 0.9               | 0    | 1.7  | 1.2               |
| 湯梨浜町 1 | 0                        | 0               | 0.5               | 0                                 | 0    | 0.2               | 0    | 0    | 0.2               |
| 湯梨浜町 2 | 0                        | 0               | 0.9               | 0                                 | 0    | 0                 | 0    | 0    | 0.1               |
| 倉吉市    | 0                        | 0               | 0.9               | 0                                 | 0    | 0.4               | 1.7  | 1.7  | 1.1               |
| 園 試    | 0.8                      | — <sup>5)</sup> | 3.6               | 0                                 | 3.3  | 2.6               | 0    | 5.0  | 12.9              |
| 琴浦町    | 0                        | 0               | 1.0               | 0                                 | 0    | 0.2               | 0    | 0    | 2.3               |
| 大山町 1  | 0                        | 0               | 1.1               | 0                                 | 1.7  | 0.2               | 1.7  | 1.7  | 1.3               |
| 大山町 2  | 0.8                      | — <sup>5)</sup> | 1.7               | 0                                 | 1.7  | 0.4               | 0    | 0    | 2.6               |
| 南部町    | 0                        | 0.8             | 0.7               | 0                                 | 0    | 0                 | 3.3  | 1.7  | 1.0               |
| 平均     | 0.4                      | 1.3             | 1.8               | 1.5                               | 1.7  | 0.8               | 1.5  | 2.2  | 2.8               |

(注)

<sup>1)</sup> 1 園当り 1 2 0 ～ 1 2 6 果について調査(試料採取：4 月 2 7、2 8、3 0 日、採集後 2 3℃ に 3 日間静置後、発病率調査)

<sup>2)</sup> 1 園当り 6 0 果について調査（6 月：6 月 1 6、1 8 日調査、7 月：7 月 2 4、2 7、2 8、3 0 日調査）

<sup>3)</sup> 平成 1 7 ～ 2 6 年の平均値

<sup>4)</sup> 調査地点を変更したためデータ無し

<sup>5)</sup> 欠側

<要約>

7 月 2 4 ～ 3 0 日の調査では、一部で中発生の園が認められたものの、被袋果実の平均発病率は 1. 5 %（平年：2. 8 %）であり、平年に比べやや少ない発生量であった。