

平成 2 7 年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病

平成 2 7 年 1 0 月 5 日
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成27年)

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 ¹⁾ (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年 ²⁾
鳥取市 1	0.4	1.0	— ³⁾	0.3	0	— ³⁾	3.2	0.6	— ³⁾
鳥取市 2	0	0.4	0.3	0.3	1.1	1.4	3.1	0.4	2.0
鳥取市 3	4.8	7.7	3.1	8.1	28.8	10.1	12.0	15.8	12.6
八頭町	0.4	0	0.4	0.3	0	1.5	3.0	0.4	3.0
湯梨浜町 1	0	0	0.3	0.3	0.7	1.3	3.0	0.4	1.9
湯梨浜町 2	0	0	0.8	0	0	0.3	3.2	0	0.7
倉吉市	0	0.5	0.6	0.3	0.3	0.8	1.3	0.4	1.4
園 試	0	2.7	2.0	1.2	19.4	8.7	3.9	21.4	23.3
琴浦町	0	0	0.3	0.9	0.3	1.5	0	1.0	2.6
大山町 1 中山	0	0.5	0.2	0.9	0.7	2.7	0.6	2.1	5.8
大山町 2 名和	0	0	0.7	1.7	0.3	2.1	0.3	0	4.0
南部町	0	0	0.4	0	0.3	0.9	0.6	2.2	2.1
平 均	0.5	1.1	0.8	1.2	4.3	2.8	2.9	3.7	5.4

(注)

¹⁾ 1 園当たり 1 0 新梢について全葉数及び病葉数を調査 (6 月：6 月 1 6、1 8 日調査、7 月：7 月 2 4、2 7、2 8、3 0 日調査、9 月：9 月 2 4、2 5 日)

²⁾ 平成 1 7～2 6 年の平均値

³⁾ 調査地点を変更したためデータ無し

<要約>

9 月 2 4、2 5 日の調査では、一部で中発生の園が認められたものの、新梢葉における発病率は 2. 9 % (平成 5. 4 %) であり、平年に比べやや少ない発生量であった。