

平成27年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ黒斑病

平成27年12月18日

鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒斑病の越冬菌密度調査(平成27年)

市 町	短果枝の病芽率 (%)			一年生枝上の枝病斑数 (個/枝)			病 枝 率 (%)		
	本 年	前 年	平年 ¹⁾	本 年	前 年	平年 ¹⁾	本 年	前 年	平年 ¹⁾
鳥取市 1	0	0	1.6 ²⁾	0.1	0	0.1 ²⁾	6.7	6.7	4.6 ²⁾
鳥取市 2	0	0	0.6	0.1	0	0.0	13.3	0	2.8
鳥取市 3	3.2	6.5	5.7	0.3	1.0	0.9	20.0	80.0	40.0
八頭町	1.6	1.5	3.4	0	0	0.1	0	0	4.9
湯梨浜町 1	1.6	4.6	2.1	0	0	0.0	0	0	1.1
湯梨浜町 2	0	0	0.8	0	0	0.1	0	6.7	4.2
倉吉市	4.5	3.2	1.8	0.1	0	0.1	6.7	0	5.5
北栄町	1.5	5.0	3.5	0	0.1	0.4	0	26.7	20.3
琴浦町	0	0	1.5	0.1	0	0.0	13.3	0	2.8
大山町 1	0	1.6	0.8	0	0	0.1	0	0	4.4
大山町 2	4.6	4.8	1.4	0	0	0.1	0	0	4.2
南部町	0	0	0.2	0	0	0.0	0	0	2.2
平 均	1.4	2.3	2.0	0.1	0.1	0.2	5.0	10.0	7.9

1) 平年…平成18年～平成27年の10年間の平均値

2) 過去4年間の平均値

- ・ 1 ほ場当たり60短果枝及び15新梢を調査。
- ・ 短果枝及び新梢は、11月30日、12月1、2日に採取。

<要約>

11月下旬～12月上旬に行ったナシ黒斑病の越冬菌密度調査の結果、一部で密度の高い園が認められたものの、短果枝の病芽率、一年枝上の病枝率はやや低く、一年枝上の枝病斑数はやや少なかった。

<対策>

黒斑病の越冬伝染源を減らすため、枝病斑削り取り後のトップジンMペースト等の塗布剤による保護、病芽の剪除を徹底する。