

ナシ・ハダニ類発生状況調査結果

平成26年7月25日
鳥取県病害虫防除所

寄生葉率(%)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本年	前年	平年*	本年	前年	平年	本年	前年	平年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
鳥取市佐治町	6.7	5.0	20.8	5.0	0	3.3	0	0	1.8
鳥取市青谷町	0	0	4.0	0	0	2.2	0	0	0.0
八頭町	0	0	7.3	0	0	1.0	0	0	0.2
倉吉市	0	0	1.0	0	0	0.5	0	0	0.0
湯梨浜町別所	11.7	0	2.3	8.3	0	1.7	1.7	0	4.7
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	3.3	0	10.8	1.7	0	7.0	0	0	0.0
大山町坪田	0	0	1.3	0	0	0.3	0	0	0.0
南部町	0	0	1.7	0	0	0.5	0	0	0.0
平均	2.4	0.6	6.8	1.7	0	1.8	0.2	0	0.7

* 平年値:平成16～25年

** 平年値:平成22～25年

10葉当たり寄生頭数(頭/10葉)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本年	前年	平年*	本年	前年	平年	本年	前年	平年
	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
鳥取市佐治町	0.7	0.2	7.3	0.5	0	1.0	0	0	0.5
鳥取市青谷町	0	0	1.2	0	0	0.4	0	0	0.0
八頭町	0	0	9.6	0	0	0.2	0	0	0.1
倉吉市	0	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0.0
湯梨浜町別所	1.7	0	0.4	1.5	0	0.3	0.2	0	1.1
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	0.3	0	3.6	0.2	0	2.8	0	0	0.0
大山町坪田	0	0	0.4	0	0	0.1	0	0	0.0
南部町	0	0	0.4	0	0	0.1	0	0	0.0
平均	0.3	0.0	2.6	0.2	0	0.6	0.0	0	0.2

* 平年値:平成16～25年

** 平年値:平成22～25年

(概要)

・調査は7月24日に実施。調査地点は黒斑病と共通。

・ハダニ類の発生量は、平年と比較すると平年並～やや少ないが、前年よりやや多い。

[クワオオハダニ] 前年比:やや多、平年比:やや少

[カンザワハダニ] 前年比:やや多、平年比:並

[ナミハダニ] 前年比:やや多、平年比:やや少