

病害虫発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No. 14)

平成26年10月6日
鳥取県病害虫防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.8			1	0.3	0	0.5
5月計	170	323.2	180	47.9	187	18.5	151	98.6
6月計	179	390.8	117	146.8	130	98.4	152	121.0
7月計	1,760	1,689.8	919	807.2	777	187.1	841	408.4
8・上	623	499.9	609	345.1	373	108.7	212	224.1
・中	391	361.8	602	236.3	340	95.8	170	247.0
・下	85	284.2	352	225.8	108	89.1	55	187.8
9・上	202	244.6	425	247.4	234	69.8	26	108.2
・中	48	267.2	122	178.8	24	77.6	5	126.3
・下	59	101.5	148	102.9	28	45.1	5	31.0

*平年：H16～25

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	2	0.3			1	0.2	0	0.0
5月計	14	22.2	3	33.2	1	0.4	2	1.6
6月計	37	52.1	18	12.6	18	6.1	4	6.2
7月計	960	651.6	353	278.4	135	60.2	163	104.7
8・上	856	421.3	586	254.2	270	66.8	206	71.6
・中	686	379.6	812	268.0	339	84.6	204	58.9
・下	118	225.8	116	203.0	58	60.6	15	26.9
9・上	65	116.9	53	52.3	45	22.2	5	7.0
・中	9	126.7	9	53.1	4	19.6	0	6.1
・下	10	37.2	10	32.3	13	3.3	0	0.4

*平年：H16～25

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0			0	0	0	0
5月計	12	8.4	6	6.2	41	2.0	23	10.0
6月計	133	401.6	212	109.6	251	81.5	145	219.7
7月計	594	1163.1	623	260.2	700	153.6	281	240.1
8・上	441	441.9	431	136.6	496	118.4	93	47.7
・中	215	160.3	248	104.8	246	53.4	76	60.8
・下	152	56.6	207	45.6	83	50.3	29	27.2
9・上	130	49.5	65	40.7	116	21.1	9	8.7
・中	85	78.4	45	26.2	29	20.9	2	9.9
・下	112	48.0	88	34.0	19	14.4	11	8.3

*平年：H16～25

表2 集合フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町				北栄町	
					本年	平年**
	本年	平年**	本年	平年**		
4月計	5	6.4	0	0.4	5	7.4
5月計	53	92.1	12	49.2	54	46.7
6月計	26	78.0	311	172.0	68	60.6
7月計	268	428.5	1,502	1,348.5	157	95.2
8・上	67	115.2	167	402.0	13	40.0
・中	12	53.3	32	97.1	10	16.0
・下	12	14.3	25	34.5	2	3.9
9・上	12	11.3	17	9.1	1	3.8
・中	11	17.1	17	8.0	1	4.5
・下	5	15.9	6	5.9	3	3.6

* ... はヒノキ林内、 は と果樹園との中間点の水田畦畔に設置

** ...平年：H16～25

< 1 情報の内容 >

(1) 予察灯等の誘殺状況(9月下旬現在)

- 1) チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、河原町はやや多く、その他の地点は平年並～やや少ない。一方、集合フェロモントラップの誘殺数は平年並～やや少ない。
- 2) クサギカメムシの誘殺数は、湯梨浜町はやや多く、その他の地点は平年並～少ない。
- 3) ツヤアオカメムシの誘殺数は、河原町、八頭町はやや多く、湯梨浜町、北栄町は平年並。