

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No. 2)

平成26年6月3日
鳥取県病虫害防除所

表1 - 1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.8			1	0.3	0	0.5
5・上	2	104.2	0	4.0	4	4.4	4	48.2
・中	12	83.3	50	9.2	29	5.7	11	20.8
・下	156	135.7	130	34.7	154	8.4	136	29.7
6・上		21.3		11.2		9.7		11.8
・中		167.0		48.6		38.5		47.8
・下		202.5		87.0		50.3		61.3

*平年：H16～25

表1 - 2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	2	0.3			1	0.2	0	0.0
5・上	0	5.5	1	3.4	1	0.1	0	0.6
・中	0	2.7	0	4.0	0	0.0	2	0.4
・下	14	13.9	2	25.8	0	0.3	0	0.6
6・上		3.3		1.2		0.8		0.2
・中		23.6		4.1		1.3		1.2
・下		25.1		7.3		4.0		4.9

*平年：H16～25

表2 集合フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町				北栄町	
	*		*		本年	平年**
	本年	平年**	本年	平年**		
4月計	5	6.4	0	0.4	5	7.4
5・上	15	48.1	0	19.5	7	19.0
・中	18	27.3	3	14.5	10	11.9
・下	20	16.7	9	15.2	37	15.8
6・上		12.6		33.8		23.1
・中		30.2		61.2		22.9
・下		35.2		77.1		14.6

* ... はヒノキ林内、 は 果樹園との中間点の水田畦畔に設置

** ...平年：H16～25

< 1 情報の内容 5月下旬現在 >

- (1) チャバネアオカメムシの予察灯の誘殺数は、平年と比較して湯梨浜町で多く、八頭町、河原町、北栄町でやや多い、一方、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、平年並～やや多い。
- (2) クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、平年と比較して八頭町ではやや多く、河原町、湯梨浜町、北栄町ではほぼ平年並である。
- (3) チャバネアオカメムシの誘殺数がやや多くなっている。園内での目撃事例もあるため、園内を注意して観察し、地域内での情報共有を徹底する。