

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No. 5)

平成26年7月2日
鳥取県病虫害防除所

表1 - 1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.8			1	0.3	0	0.5
5月計	170	323.2	180	47.9	187	18.5	151	98.6
6・上	58	21.3	21	11.2	32	9.7	49	11.8
・中	19	167.0	41	48.6	12	38.5	10	47.8
・下	102	202.5	55	87.0	86	50.3	93	61.3
7・上		415.2		147.1		55.0		126.8
・中		639.7		271.0		72.4		151.5
・下		634.9		406.1		59.7		130.1

*平年：H16～25

表1 - 2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	2	0.3			1	0.2	0	0.0
5月計	14	22.2	3	33.2	1	0.4	2	1.6
6・上	15	3.3	6	1.2	12	0.8	2	0.2
・中	2	23.6	8	4.1	1	1.3	1	1.2
・下	20	25.1	4	7.3	5	4.0	1	4.9
7・上		73.4		14.3		6.8		7.8
・中		219.4		71.2		16.2		40.0
・下		358.7		192.9		37.3		56.9

*平年：H16～25

表1 - 3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計					0	0	0	0
5月計	12	8.4	6	6.2	41	2.0	23	10.0
6・上	17	2.2	11	2.2	112	1.5	59	5.8
・中	13	110.7	49	22.2	28	18.6	20	63.5
・下	103	288.6	152	85.1	111	61.4	66	150.5
7・上		221.4		81.1		41.9		131.5
・中		490.9		83.6		56.5		74.8
・下		450.8		95.5		55.2		33.8

*平年：H16～25

表2 集合フェロモントラップにおけるチャバネアカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町				北栄町	
	*		*		本年	平年**
	本年	平年**	本年	平年**		
4月計	5	6.4	0	0.4	5	7.4
5月計	53	92.1	12	49.2	54	46.7
6・上	21	12.6	116	33.8	38	23.1
・中	2	30.2	5	61.2	5	22.9
・下	3	35.2	190	77.1	25	14.6
7・上		124.2		328.2		32.5
・中		168.0		546.8		35.4
・下		136.4		473.4		27.3

* ... はヒノキ林内、 は と果樹園との中間点の水田畦畔に設置

** ...平年：H16～25

< 1 情報の内容 6月下旬現在 >

- (1) チャバネアカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、河原町で平年並、湯梨浜町、北栄町でやや多い。一方、集合フェロモントラップの誘殺数は、八頭町(ヒノキ林内)はやや少ないものの、八頭町(水田畦畔)北栄町ではやや多い。
- (2) クサギカメムシの予察灯における誘殺数は平年並となっている。
- (3) ツヤアカメムシの予察灯における誘殺数は、平年と比較して八頭町、河原町、湯梨浜町でやや多く、北栄町で平年並。
- (4) 6月下旬現在、カメムシ類の誘殺数はやや多くなっている。越冬世代成虫の発生量はやや多いことが見込まれ、7月中旬以降、果樹園への飛来が増加するものと見込まれる。