

平成26年度病害虫発生予察指導情報 対象病害虫：ナシ黒斑病

平成26年6月30日
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成26年)

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 ¹⁾ (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	1.0	0.4	— ³⁾						
鳥取市 2	0.4	1.3	0.4						
鳥取市 3	7.7	8.9	2.5						
八頭町	0	0	0.4						
湯梨浜町 1	0	0	0.3						
湯梨浜町 2	0	0.4	0.8						
倉吉市	0.5	0	0.6						
園 試	2.7	2.9	1.8						
琴浦町 竹ノ内	0	0.8	0.3						
大山町 1 中山	0.5	0.4	0.2						
大山町 2 名和	0	0.4	0.8						
南部町	0	0	0.4						
平 均	1.1	1.3	0.8						

(注)

¹⁾ 1園当たり10新梢について全葉数及び病葉数を調査

²⁾ 平成16～25年の平均値

³⁾ 欠測

<要約>

6月18、19、20日の調査では、新梢葉における発病率は1.1%（平年0.8%）であり、ほぼ平年並の発生量であった。

<対策>

今後、発病の多い園では、降雨が多い場合には慣行防除に加えて追加防除を実施する。防除薬剤には、有機銅水和剤（キノンドーフロアブル、ドキリンフロアブル）、アリエッティC水和剤、ベルクトフロアブルなどがある。

平成26年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ黒斑病

平成26年6月30日
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の果実における発病率（平成26年）

地 区	ポリ袋検定法による 幼果の発病率 ¹⁾ (%)			被 袋 果 実 の 発 病 率 (%)					
				6 月			7 月		
	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市1	0	0	— ³⁾	0	0	— ³⁾			
鳥取市2	0	0	1.0	0	0	0.2			
鳥取市3	12.5	0	5.6	11.7	5.0	2.9			
八頭町 ⁴⁾	0	0	1.1	1.7	0	0.9			
湯梨浜町1	0	0	0.5	0	0	0.2			
湯梨浜町2	0	0	0.9	0	0	0			
倉吉市	0	0	0.9	0	1.7	0.9			
園 試	— ³⁾	0	3.3	3.3	1.7	2.3			
琴浦町	0	0.9	1.0	0	0	0.5			
大山町1	0	0.9	1.1	1.7	0	0			
大山町2	— ³⁾	0	1.6	1.7	0	0.7			
南部町	0.8	0	0.6	0	0	0			
平均	1.3	0.2	1.6	1.7	0.7	0.8			

(注)

¹⁾ 1園当たり100～134果について調査(試料採取：4月29日及び5月2日、採集後23℃に3日間静置後、発病率調査)

²⁾ 平成16～25年の平均値

³⁾ 欠測

⁴⁾ 1園当たり60果について調査(調査日：6月18、19、20日)

<要約>

被袋果実の平均発病率は、調査対象地点全体で1.7%（平年：0.8%）であり、平年と比べて発生量はやや多かった。