

# 平成26年度病害虫発生予察指導情報

## 対象病害虫：ナシ黒星病

平成27年2月25日

鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒星病の腋花芽における病芽率（2015）

| 地 区 名  |           | 品 種               | 花芽数 | 病芽数 | 病 芽 率（％） |     |     |
|--------|-----------|-------------------|-----|-----|----------|-----|-----|
|        |           |                   |     |     | 本 年      | 前 年 | 平 年 |
| 東<br>部 | 鳥取市1      | 豊 水               | 115 | 5   | 4.3      | 0   | 1.2 |
|        |           | 幸 水               | 106 | 0   | 0        | 1.8 | 1.3 |
|        | 鳥取市2 佐治町  | 豊 水               | 550 | 10  | 1.8      | 1.6 | 1.4 |
|        |           | 幸 水 <sup>※4</sup> | —   | —   | —        | 0   | 1.0 |
|        | 鳥取市3 青谷町  | 豊 水               | 118 | 0   | 0        | 0.6 | 0.6 |
|        |           | 幸 水 <sup>※1</sup> | 27  | 0   | 0        | 0   | 1.6 |
|        | 八頭町 （八東）  | 豊 水               | 181 | 13  | 7.2      | —   | 1.2 |
| 中<br>部 | 湯梨浜町 （東郷） | 新甘泉 <sup>※2</sup> | 105 | 0   | 0        | 0.6 | 1.2 |
|        | 倉吉市       | 豊 水               | 115 | 4   | 3.5      | 3.3 | 2.0 |
|        |           | 幸 水               | 68  | 0   | 0        | 1.0 | 0.1 |
|        | 北栄町 （大栄）  | 豊 水               | 140 | 4   | 2.9      | 2.8 | 1.5 |
|        |           | 幸 水               | 118 | 1   | 0.8      | 0   | 0.7 |
|        | 琴浦町 （東伯）  | 幸 水               | 61  | 0   | 0        | 1.3 | 0.6 |
| 西<br>部 | 大山町1 （中山） | 新甘泉 <sup>※3</sup> | —   | —   | —        | 0   | 0.4 |
|        | 大山町2 （名和） | 新甘泉 <sup>※2</sup> | 99  | 0   | 0        | 1.6 | 1.3 |
| 平 均    |           | —                 | —   | —   | 1.6      | 1.0 | 1.1 |

枝の採集日：平成27年1月13日～27日（1園当たり10本の新梢を採取し、約5日間20℃で加温後調査）

調査日：平成27年1月26日～2月4日

平 年：平成17年～26年

※1 平成23年に調査地点を変更しているため、平年値は変更前の数値を記載。

※2 平成26年に調査地点及び品種を変更しているため、平年値は変更前の数値を記載。

※3 枝の採取ができなかったため欠測

※4 品種を豊水に変更したため欠測

### <要約>

- ・本年のナシ黒星病の芽りん片における病芽率は、平年に比べやや多かった。
- ・昨年発生の多かった園では芽基部病斑に注意し、見つけ次第基部から切除する。