

平成26年度病虫害発生予報第8号

平成26年9月3日
鳥取県病虫害防除所

予報の概要

区 分	農 作 物 名	病 害 虫 名	発生時期	予想発生量
普通作物	ダイズ	ハスモンヨトウ	—	平 年 並
		カメムシ類	—	やや多い
果 樹	ナ シ	黒斑病	—	やや多い
		黒星病	—	平 年 並
		クワコナカイガラムシ	平 年 並	やや多い
		シンクイムシ類	平 年 並	平年並～やや多い
	ブドウ	べと病	—	平 年 並
		ブドウトラカミキリ	平 年 並	平 年 並
		チャノキイロアザミウマ	—	平 年 並
		ハマキムシ類	平 年 並	平 年 並
	共通（ナシ、カキ）	カメムシ類	—	やや多い
野 菜	ネ ギ	黒斑病	平 年 並	平 年 並
		さび病	早 い	やや多い
		べと病	平 年 並	やや多い
		ネギハモグリバエ	平 年 並	平 年 並
		ネギアザミウマ	平 年 並	平 年 並
	ネギ、ナガイモ	シロイチモジヨトウ	平 年 並	平 年 並
	ナガイモ	炭疽病	平 年 並	やや多い
		ナガイモコガ	平 年 並	平 年 並
		ハダニ類	平 年 並	平 年 並
	キャベツ、 ブロッコリー	べと病	平 年 並	やや多い
		黒腐病	やや早い	やや多い
		軟腐病	平 年 並	平 年 並
		コナガ	平 年 並	平 年 並
		ヨトウムシ	平 年 並	平 年 並
		ハイマダラノメイガ	平 年 並	平 年 並
	キャベツ、ブロッコリー、 イチゴ	ハスモンヨトウ	平 年 並	平 年 並
	シ バ	さび病	やや早い	やや多い
		スジキリヨトウ	平 年 並	平 年 並
		シバツトガ	平 年 並	平 年 並

気象予報（抜粋）

1 か月予報（8月30日～9月29日：8月28日、広島地方気象台発表）


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わるでしょう。


平均気温は、平年並の確率50%です。降水量は、平年並または少ない確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、低い確率70%です。2週目は、平年並の確率50%です。3～4週目は、平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう1か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



普通作物

[ダイズ]

1 ハスモンヨトウ

(1) 予報の内容

発生地域 県内全域
発 生 量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 8月第6半旬現在、フェロモントラップによる誘殺数は平年並である。

イ これまでの発生状況及び、向こう1か月の気象予報から、本種の発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 中齢～老齢幼虫が混在する場合は、ロムダン粉剤DL、ミミックジョーカー粉剤DL、ラービフロアブル、マトリックフロアブル、フェニックス顆粒水和剤、プレバソフロアブル5等を散布すると、比較的效果が高い。

イ 防除の目安は、1a当たりの白変葉か所数3～5か所以上とする。なお、白変葉の確認にあたっては、ほ場周辺からの観察のみならず、ほ場内でも観察を行う。

2 カメムシ類

(1) 予報の内容

発生地域 県内全域

発 生 量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 8月5半旬現在、予察灯におけるイチモンジカメムシ、アオクサカメムシ及びホソヘリカメムシの総誘殺数はやや多い。

イ 向こう1か月の気象予報から、本種の発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

近年、9月以降に密度が急増する傾向があるので、基幹防除終了後も引き続き発生状況に注意し、発生が多い場合は病虫害防除指針等を参考に追加防除を行う。

果 樹

[ナ シ]

1 黒斑病

(1) 予報の内容

発 生 量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、県予察ほ場（北栄町）における新梢葉での発生量は平年と比べてやや多い。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 新梢葉の発病増加と花芽への感染を防ぐため、収穫終了後の薬剤散布を徹底する。

イ 薬剤は、収穫終了後にアントラコール顆粒水和剤500倍液などを散布する。
なお、現在、新梢葉の発病が多い園では、収穫後に必ず2回の防除を行って、病原菌の花芽への侵入を防ぐ。

ウ 越冬菌密度を下げるため、落葉後（11～12月）の落葉処分を励行する。

2 黒星病

(1) 予報の内容

発 生 量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、県予察ほ場（北栄町）における果そう葉での発生量はほぼ平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 秋期の発病は早期落葉と越冬菌密度の増加につながるので、収穫終了後の薬剤散布を徹底する。

イ 収穫終了後にアントラコール顆粒水和剤500倍液、ポリベリン水和剤1, 500倍液などを散布する。

ウ 多発園では、10月下旬及び11月上旬にデランフロアブル1, 000倍、チウラム水和剤（トレノックスフロアブル又はチオノックスフロアブル）500倍液などをそれぞれ1回散布する。

エ 越冬菌密度を下げるため、落葉後（11～12月）の落葉処分を励行する。

3 クワコナカイガラムシ

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発 生 量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 県予察ほ場（北栄町）における発生量は平年並である。

イ 収穫果実において、コナカイガラムシ類の寄生果が散見されている。

ウ 第2世代の幼虫ふ化時期は、ほぼ平年並の8月下旬～9月上旬頃と見込まれる。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 秋期に本種の発生が認められる園では、翌年に多発する可能性が高いので、収穫後の防除を徹底する。

イ 多発園では、収穫が終わり次第ダイアジノン水和剤34の1，000倍液などを散布する。

4 シンクイムシ類

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発 生 量 平年並～やや多い

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、フェロモントラップにおけるシンクイムシ類成虫の誘殺数は、ほぼ平年並である。

イ 9月1日現在、県予察ほ場（北栄町）におけるシンクイムシ類の果実被害は増加傾向にある。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 中生品種（二十世紀、ゴールド二十世紀など）でシンクイムシ類の被害が多い場合は、収穫中の追加防除を検討する。

イ 今後、晩生品種（新高、新興、王秋など）の被害発生が予想されるため防除を徹底する。特に、二十世紀などで被害が多かったナシ園や地域では、被害発生が懸念されるので注意する。

ウ 薬剤はアグロスリン水和剤2，000倍液、テルスターフロアブル3，000倍液、サムコルフロアブル10の5，000倍液、フェニックスフロアブル4，000倍液などを散布する。なお、薬剤の散布にあたっては、農薬の使用基準を遵守する。

[ブドウ]

1 ベと病

(1) 予察の内容

発 生 量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、現地における発生量はほぼ平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生量はほぼ平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 秋期の発病は早期落葉と越冬菌密度の増加につながるので、収穫終了後の薬剤散布を1～2回行う。

イ 薬剤は、収穫終了後にICボルドー48Qの50倍又は3-2式～6-3式ボルドー液を散布する。なお、無加温ハウス栽培でのビニール除去後及び露地栽培では、散布時に固着性展着剤を加用する。

2 ブドウトラカミキリ

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並
発生量 平 年 並

(2) 予報の根拠

- ア 県予察ほ場（北栄町）における発生量は、ほぼ平年並である。
イ 成虫羽化最盛期は、ほぼ平年並の8月下旬～9月上旬頃と見込まれる。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 防除適期は9月中旬頃であり、薬剤はスミチオン水和剤40の800倍液などを散布する（MEPを含む製剤の総使用回数に注意する）。
イ 本種の羽化は長期間に及ぶため、9月の防除では十分な効果が得られない場合がある。そのため、被害が多い園では、必ず10月中旬にモスピラン水溶剤2,000倍液などを追加散布する。

3 チャノキイロアザミウマ

(1) 予報の内容

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、県予察ほ場（北栄町）では平年並の発生量である。
イ 向こう1か月の気象予報から、ほぼ平年並の発生量と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 多発園では、収穫終了後に小粒種ではコルト顆粒水和剤3,000倍液など、大粒種ではパダンSG水溶剤1,500倍液などを散布する。
イ 9月に発生が増加すると越冬量が多くなり、翌年の発生源となるため、多発園では防除を徹底する。

4 ハマキムシ類

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並
発生量 平 年 並

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、フェロモントラップにおける誘殺数は平年並となっている。
イ 8月下旬現在、県予察ほ場（北栄町）では平年並の発生量である。
ウ 向こう1か月の気象予報とこれまでの発生経過から、次世代成虫の発生ピークはほぼ平年並の9月中～下旬頃と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 近年、秋期の気温が高めに推移し、9月以降多発生となるほ場が認められる。秋期の発生は越冬密度を高め、翌年春の発生量の増加を招くため、収穫後であっても注意してほ場を観察する。
イ 多発園では、フェニックスフロアブル4,000倍液、サイアノックス水和剤の1,000倍液などを追加散布する。

[共通（ナシ、カキ）]

1 カメムシ類（平成26年7月9日付、病虫害発生予察注意報第2号発表）

(1) 予報の内容

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、カメムシ類の誘殺数はほぼ平年並である。
イ 県予察ほ場（北栄町、殺虫剤無散布、無袋）のナシ果実では、例年カメムシ

類の寄生はみられないが、本年は9月1日現在、カメムシ類の寄生がみられている。

ウ 収穫果実のカメムシ類の被害果が散見される。

(3) 防除上注意すべき事項

ほ場をよく観察し、カメムシ類の発生がみられる場合は、追加防除を行う。
薬剤は平成26年度病害虫発生予察注意報第2号（平成26年7月9日発表）を参考にする。

野 菜

[ネ ギ]

1 黒斑病

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発生量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における発生量は平年並である。

イ 本病は平均気温25℃前後が発病適温であり、降雨が多い場合に多発する。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 根傷み、肥料不足によって発病が助長されるので、肥培管理に注意する。

イ 薬剤は、マンゼブ水和剤（ジマンダイセン水和剤、ペンコゼブ水和剤など）600倍液、ポリバリン水和剤1,500倍液などを発病初期から散布する。
発病が増加する場合は、ロブラール水和剤1,000倍液などを散布する。

2 さび病

(1) 予報の内容

発生時期 早い

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 秋期の初発時期は、平年に比べて早く、8月下旬現在、既に一部の現地ほ場で発生が認められる。

イ 本病は、秋季に比較的低温で、降雨が多い場合に発生が多くなる。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 未発病のほ場では、9月初旬頃（平坦部）からマンゼブ水和剤（ジマンダイセン水和剤、ペンコゼブ水和剤など）600倍液を10日間隔で2～3回散布する。

イ 発病が認められるほ場では、オンリーワンフロアブル1,000倍液、ラリー乳剤4,000倍液などを散布する。

3 ベと病

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における発生は認められていない。

イ 春期における発生は多かった。

ウ 本病は、15～20℃程度の気温で降雨が続くと発病が増加する。

エ 向こう1か月の気象予報によると、発生時期は平年並、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病後は早期にまん延するため発病前からの防除に努める。

イ ランマンフロアブル2, 000倍液、アリエッティ水和剤800倍液、マンゼブ水和剤(ジマンダイセン水和剤、ペンコゼブ水和剤など)600倍液などを予防散布する。

ウ 発病確認後は直ちに、リドミルゴールドMZ1, 000倍液、フォリオゴールド1, 000倍液、レーバスフロアブル2, 000倍液、フェスティバルC水和剤1, 000倍液などを散布する。

エ 同一成分を含む薬剤は連用しない。また、成分ごとの総使用回数に注意して薬剤を選定する。

4 ネギハモグリバエ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

防除薬剤は、ベストガード粒剤6kg/10a株元処理、アグロスリン乳剤2, 000倍液、オンコルマイクロカプセル1, 000倍液などの散布を行う。

5 ネギアザミウマ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ハチハチ乳剤1, 000倍液、ランネート45DFの1, 000倍液、オンコルマイクロカプセル1, 000倍液などを7～10日間隔で薬剤を替えて散布する。

[ネギ、ナガイモ]

1 シロイチモジヨトウ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、県予察ほ場(北栄町)でのフェロモントラップにおける成虫の誘殺数は平年並である。

イ 現地調査ほ場(ネギ)における発生量は平年並である。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 若齢幼虫期が防除適期である。これを逃すと極めて防除が困難となるため、早期発見に努め、早めに防除を行う。
- イ ネギの防除薬剤は、トルネードエース DF 1， 0 0 0 倍液、スピノエース顆粒水和剤 5， 0 0 0 倍液などを散布する。
- ウ ナガイモ（ムカゴを含む）の防除薬剤は、デルフィン顆粒水和剤 1， 0 0 0 倍液を用いて防除を行う。

[ナガイモ]

1 炭疽病

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、県予察ほ場（北栄町）における発生量はやや多い。
- イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期は平年並、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 肥料切れしないように適度な追肥を行う。
- イ 茎葉の繁茂により薬液が葉裏にかかりにくいので、薬剤散布は丁寧に行う。
- ウ 大雨や台風の直後には、天候回復後にできるだけ早く薬剤散布する。
- エ 防除薬剤は、ダコニール 1 0 0 0 の 1， 0 0 0 倍液（ムカゴにも登録あり）、ジマンダイセン水和剤 4 0 0 ～ 6 0 0 倍液、アミスター 2 0 フロアブル 2， 0 0 0 倍液などを散布する。

2 ナガイモコガ

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発生量 平 年 並

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、県予察ほ場（北栄町）における発生量は平年並である。
- イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア アタブロン乳剤 2， 0 0 0 倍液（ムカゴにも登録あり）、トレボン乳剤 1， 0 0 0 倍液（ムカゴにも登録あり）、モスピラン顆粒水溶剤 4， 0 0 0 倍（ムカゴにも登録あり）などを7～10日間隔で2回程度散布する。
- イ 茎葉の繁茂により薬液が葉裏にかかりにくいので、薬剤散布は丁寧に行う。

3 ハダニ類

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発生量 平 年 並

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、県予察ほ場（北栄町）における発生量は平年並である。
- イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 薬剤は、コロマイト乳剤 1， 0 0 0 倍液（ムカゴにも登録あり）、コテツフロアブル 2， 0 0 0 倍液（ムカゴにも登録あり）などを葉裏にも薬剤が付着するように丁寧に散布する。

[キャベツ、ブロッコリー]

1 ベと病

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並
発 生 量 やや多い

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における本病の発生は認められていない。
- イ 本病は気温が比較的低温、降雨が多いと発生が多くなる。
- ウ これまでの気象経過および向こう1か月の気象予報から、発生時期は平年並、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア キャベツの防除薬剤は、ヨネポン水和剤500倍液、ダコニール1000の1,000倍液、マンゼブ水和剤（ジマンダイセン水和剤、ペンコゼブ水和剤など）400～600倍液、フォリオゴールド800～1,000倍などを予防散布する。
- イ ブロッコリーの防除薬剤は、フォリオゴールド1,000倍液などを予防散布する。なお、本剤は花蕾形成前までの散布とする。

2 黒腐病

(1) 予報の内容

発生時期 やや早い
発 生 量 やや多い

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、現地調査ほ場において本病の発生が散見されており、発生はやや早い。
- イ 本病は、降雨が多い場合や、台風に伴う風雨によって発病が助長されやすい。
- ウ 向こう1か月の気象予報から、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 害虫の食害痕も病原菌の侵入口となるため害虫防除を徹底する。
- イ 肥料不足になると多発しやすいため、肥料切れしないよう注意する。
- ウ 発生前の予防防除を行う。特に大雨や台風の直後には、天候の回復を待ってできるだけ早く薬剤散布する。
- エ キャベツの防除薬剤は、カスガマイシン・銅水和剤（カスミンボルドー又は銅シン水水和剤）1,000倍液、ドキリンフロアブル500～1,000倍液、ヨネポン水和剤500倍液、Zボルドー500倍液などを散布する。
- オ ブロッコリーの防除薬剤は、カスガマイシン・銅水和剤（カスミンボルドー又は銅シン水水和剤）1,000倍液、キノンドー水和剤40の800倍液、ヨネポン水和剤500倍液、Zボルドー500倍液などを散布する。

3 軟腐病

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並
発 生 量 平 年 並

(2) 予報の根拠

- ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における本病の発生は認められていない。
- イ 本病は、気温が高く、降雨が多いと発生が多くなる。また、台風に伴う風雨によっても発病が助長されやすい。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 害虫の食害痕も病原菌の侵入口となるため、害虫防除を徹底する。

イ 発生前の予防防除を行う。特に大雨や台風の直後には、天候の回復を待ってできるだけ早く薬剤散布する。

ウ キャベツの防除薬剤は、カスガマイシン・銅水和剤（カスミンボルドー又は銅パーシン水和剤）1,000倍液、ドキリンフロアブル800～1,000倍液、ヨネポン水和剤500倍液、Zボルドー500倍液などを散布する。

エ ブロッコリーの防除薬剤は、ナレート水和剤1,000倍液、Zボルドー500倍液などを散布する。

4 コナガ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、県予察ほ場（北栄町）でのフェロモントラップにおける成虫の誘殺数は平年並である。

イ 現地調査ほ場における発生量は平年並である。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 育苗期～定植時には、アクタラ粒剤5の2g/株（育苗期後半）の株元散布、プレバソンフロアブル5の100倍液のセルトレイ灌注（育苗期後半～定植当日）などを行う。

イ 本圃での発生時には、トルネードエースDF2,000倍液、スピノエース顆粒水和剤5,000倍液、アニキ乳剤2,000倍液などを散布する。

5 ヨトウムシ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア キャベツの防除薬剤は、スピノエース顆粒水和剤5,000倍液、トルネードエースDF2,000倍液などを散布する。

イ ブロッコリーの防除薬剤は、マトリックフロアブル2,000倍液、ランネート45DFの1,000倍液などを散布する。

6 ハイマダラノメイガ（ダイコンシンクイムシ）

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア キャベツの防除薬剤は、プリンスフロアブル2,000倍液、スピノエース

顆粒水和剤 5， 0 0 0 倍液、トルネードエース DF 2， 0 0 0 倍液などを、1 週間程度の間隔で散布する。

イ ブロッコリーの防除薬剤は、プリンスフロアブル 2， 0 0 0 倍液などを散布する。

[キャベツ、ブロッコリー、イチゴ]

1 ハスモンヨトウ

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発 生 量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 8 月下旬現在、県予察ほ場におけるフェロモントラップの誘殺虫数は平年並である。

イ 現地調査ほ場（キャベツ、ブロッコリー）における発生量は平年並である。

ウ 向こう 1 か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 薬剤の感受性が高い若齢幼虫のうちに防除を行う。ほ場内をよく観察し、発生がみられる場合には直ちに防除を行う。

イ キャベツでは、アニキ乳剤 2， 0 0 0 倍液、トルネードエース DF 2， 0 0 0 倍液、マトリックフロアブル 2， 0 0 0 倍液などを散布する。

ウ ブロッコリーでは、アニキ乳剤 2， 0 0 0 倍液、プレオフロアブル 1， 0 0 0 倍液などを散布する。

エ イチゴでは、マッチ乳剤 3， 0 0 0 倍液、フェニックス顆粒水和剤 2， 0 0 0 倍液、トルネードエース DF 2， 0 0 0 倍液などを散布する。

[シ バ]

1 さび病

(1) 予報の内容

発生時期 やや早い

発 生 量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 8 月下旬現在、現地生産シバ調査ほ場において本病の発生が認められる。

イ 向こう 1 か月の気象予報から、発生時期はやや早く、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

発生初期にバシタック水和剤 7 5 の 5 0 0 ～ 1， 0 0 0 倍液などを散布する。

2 スジキリヨトウ

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発 生 量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 8 月下旬現在、現地調査ほ場における発生量は平年並である。

イ 向こう 1 か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

若齢幼虫を対象にダイアジノン乳剤 4 0 の 1， 0 0 0 倍液、スミチオン乳剤 1， 0 0 0 倍液などを散布する。

3 シバツトガ

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発 生 量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 8月下旬現在、現地調査ほ場における発生量は平年並である。

イ 向こう1か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

防除薬剤は、ダイアジノン乳剤40の1，000倍液、スミチオン乳剤1，000倍液などを散布する。

[おしらせ]

農薬の使用に当たっては、農薬使用基準を遵守するとともに、周辺への飛散には十分注意しましょう。

農薬の詳しい登録内容は、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターの「農薬登録情報検索システム」から検索できます。(http://www.famic.go.jp/)

なお、農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ず御確認ください。

<鳥取県病虫害防除所ホームページ>

アドレス http://www.jppn.ne.jp/tottori/
--

病虫害発生予察情報、フェロモントラップ調査結果（ナシのシンクイムシ類）などの参考情報、病虫害の診断方法などの情報をお知らせしていますので、ご利用下さい。

<お問い合わせ>

普通作物関係：〒680-1142 鳥取市橋本 260

鳥取県病虫害防除所

(TEL：0857-53-1345、E-mail：boujyot@titan.ocn.ne.jp)

もしくは

鳥取県農業試験場環境研究室

(TEL：0857-53-0721、FAX：0857-53-0723)

果樹・野菜・花き関係

〒689-2221 東伯郡北栄町由良宿 2048

鳥取県農林総合研究所園芸試験場環境研究室

(TEL：0858-37-4211、FAX：0858-37-4822)

※予報第9号の発表は、10月1日（水）の予定です。