

# 平成25年度病害虫発生予報第11号

平成26年2月6日  
鳥取県病害虫防除所

## 予報の概要

区分	農作物名	病害虫名	発生時期	予想発生量
野菜	ラッキョウ	白色疫病	平年並	やや多い

## 気象予報（抜粋）


1か月予報（2月1日～2月28日：1月31日、広島地方気象台発表）

向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。


山陰では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

週別の気温は、1週目は、平年並または高い確率ともに40%です。2週目は、低い確率60%です。

### <向こう1か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>



### <気温経過の各階級の確率(%)>



# 野菜

## [ラッキョウ]

### 1 白色疫病

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 やや多い

#### (2) 予報の根拠

ア 1月下旬現在、県東部～中部の現地調査ほ場における本病の発生量は、ほぼ平年並であるが、県東部の一部で多発ほ場が散見されている。

イ 本病は、降雪後の雪解け水や連続降雨により、発病が急速に広がりやすい。

ウ 昨年が発生ほ場や、積雪の多い場所では、局所的に多発するおそれがある。

エ 向こう1か月の気象予報によると、本病の発生にやや好適な条件が続くものと予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア 本病の発生が認められる場合は、フォリオゴールド1，000倍液又はホライズンドライフロアブル1，000倍液に展着剤を加用して茎葉にむらなく散布する。

イ 2～3月の後期発生を予防するため、雪解け直後や連続降雨時の雨の止み間などに、フロンサイド水和剤1，000倍液に展着剤を加用して散布する。

ウ 罹病株は伝染源となるので、ほ場外に持ち出し処分する。

[おしらせ]

**農薬の使用に当たっては、農薬使用基準を遵守するとともに、周辺への飛散には十分注意しましょう。**

農薬の詳しい登録内容は、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターの「農薬登録情報検索システム」から検索できます。(http://www.famic.go.jp/)

なお、農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ず御確認ください。

**<鳥取県病虫害防除所ホームページ>**

アドレス <http://www.jpnpn.ne.jp/tottori/>

病虫害発生予察情報、フェロモントラップ調査結果（ナシのシンクイムシ類）などの参考情報、病虫害の診断方法などの情報をお知らせしていますので、ご利用下さい。

**<お問い合わせ>**

普通作物関係：〒680-1142 鳥取市橋本 260

鳥取県病虫害防除所

(TEL：0857-53-1345、E-mail：boujyot@titan.ocn.ne.jp)

もしくは

鳥取県農林総合研究所農業試験場環境研究室

(TEL：0857-53-0721、FAX：0857-53-0723)

果樹・野菜・花き関係

〒689-2221 東伯郡北栄町由良宿 2048

鳥取県農林総合研究所園芸試験場環境研究室

(TEL：0858-37-4211、FAX：0858-37-4822)

※予報第12号の発表は、3月6日（木）の予定です。