

平成24年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ黒星病（No. 14）

平成25年2月12日

鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒星病の腋花芽における病芽率（2013）

地 区 名		品 種	花芽数	病芽数	病 芽 率 (%)			
					本 年	前 年	平 年	
東 部	鳥取市1	豊 水	122	2	1.6	1.2	1.4	
		幸 水	118	6	5.1	0	0.9	
		鳥取市2 佐治町	豊 水	352	2	0.6	0.7	1.3
			幸 水	129	2	1.6	- ²	0.8
	鳥取市3 青谷町	豊 水	111	0	0	0	0.6	
		幸 水 ¹	200	1	0.5	0.5	2.0	
	八頭町1 (郡家)	豊 水 ³	-	-	-	0	0.7	
		幸 水 ³	-	-	-	0	1.2	
	八頭町2 (八東)	豊 水	132	4	3.0	0	1.4	
中 部	湯梨浜町1(泊)	幸 水	147	0	0	0	1.3	
		湯梨浜町2(東郷)	豊 水 ³	-	-	-	0.7	-
			幸 水 ³	-	-	-	1.2	0.5
	倉吉市	豊 水	169	1	0.6	3.6	4.0	
		幸 水	103	0	0	0	0	
	北栄町 (大栄)	豊 水	190	0	0	4.7	0.8	
		幸 水	141	2	1.4	1.4	0.5	
	琴浦町 (東伯)	豊 水 ³	-	-	-	0	1.1	
		幸 水	104	2	1.9	0	0.3	
西 部	大山町1 (中山)	豊 水	196	2	1.0	0	0.4	
	大山町2 (名和)	豊 水	137	0	0	1.3	1.5	
平 均		-	-	-	1.1	0.8	1.1	

枝の採集日：平成25年1月16日～1月18日（1園当たり10本の新梢を採取し、約5日間20℃で加温後調査）

調査日：平成25年1月21日～1月24日

平 年：平成15年～24年

- 1 平成23年に調査地点を変更しているため、平年値は調査地点変更前の数値を記載。
- 2 平成23年は欠測
- 3 伐採のため調査なし

< 要約 >

・本年のナシ黒星病の芽りん片における病芽率は平年並であった。