

# 平成24年度病虫害発生予報第3号

平成24年5月10日  
鳥取県病虫害防除所

## 予報の概要

区分	農作物名	病虫害名	発生時期	予想発生量
普通作物	イネ	いもち病(葉いもち) 縞葉枯病(ヒメトビウンカ) ニカメイガ	平年並 平年並 平年並	平年並 平年並 やや少ない
		イネミズゾウムシ	平年並(平坦地) 平年並(中間地) やや遅い(山間地)	やや少ない
果樹	ナシ	黒斑病 黒星病 クワコナカイガラムシ ハダニ類 アブラムシ類	平年並 平年並 平年並 やや遅い やや遅い	平年並 平年並 やや多い 平年並 平年並
	果樹全般	カメムシ類	平年並	やや多い
野菜	スイカ	菌核病 つる枯病 うどんこ病	平年並 平年並 平年並	平年並 平年並 平年並
	スイカ、メロン	アブラムシ類 ハダニ類	やや遅い やや早い	平年並 やや多い
	シバ	葉腐病(ラージパッチ)	平年並	平年並


## 気象予報(抜粋)

1か月予報(5月5日~6月4日:5月4日、広島地方気象台発表)


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

平年に比べて晴れの日が多い見込みです。向こう1か月の降水量は平年並または少ない確率ともに40%です。週別の気温は、1週目は平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう1か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



## 普通作物

### [イネ]

#### 1 いもち病（葉いもち）

##### （1）予報の内容

発生地域	県内全域
発生時期	平年並
発生量	平年並

##### （2）予報の根拠

ア 前年の穂いもちの発生はやや少なかったため、種子の保菌率はやや少ないものと見込まれる。

イ 向こう3か月の気象予報から、発生時期、発生量ともに平年並と見込まれる。

##### （3）防除上注意すべき事項

ア 苗におけるいもち病は急激に蔓延するため、発生がみられた場合は直ちに葉いもち防除用粉剤又は水和剤を散布し、その後は病勢に応じて追加防除を行う。使用薬剤については、病害虫防除指針等を参考にする。

イ 育苗箱施用剤を使用する場合は、使用時期及び使用量を守って均一に散布する。

ウ 山間部などのいもち病の常発地では、育苗箱施用剤を使用しても十分な効果が得られない場合があるので、ほ場の見回りなどを行い早期発見に努める。

エ 補植用置き苗が本田での発生源となることが多いので、補植後の残り苗は速やかに処分する。

#### 2 縞葉枯病（ヒメトビウンカ）

##### （1）予報の内容

発生地域	県内全域
発生時期	平年並
発生量	平年並

##### （2）予報の根拠

ア これまでの気温の推移、及び向こう1か月の気象予報から、本病を媒介するヒメトビウンカの発生時期は平年並、発生量は平年並と見込まれる。

イ 前年の本病および、ヒメトビウンカの発生は平年並であった。

##### （3）防除上注意すべき事項

県東部などの常発地では、病害虫防除指針等を参考に、ヒメトビウンカに対して登録のある育苗箱施用剤を使用して防除を行う。

#### 3 ニカメイガ

##### （1）予報の内容

発生地域	県内全域
発生時期	平年並
発生量	やや少ない

##### （2）予報の根拠

ア これまでの気温の推移、及び向こう1か月の気象予報から、本虫の発生時期は平年並と見込まれる。

イ 前年の第2世代幼虫の発生量はやや少なかったため、本種の越冬量はやや少ないものと見込まれる。

##### （3）防除上注意すべき事項

常発地では、病害虫防除指針等を参考に、本種に対して効果の高い育苗箱施用剤を使用する。

#### 4 イネミズゾウムシ

##### (1) 予報の内容

発生地域	県内全域
発生時期	平年並(平坦地、中間地) やや遅い(山間地)
発生量	やや少ない

##### (2) 予報の根拠

ア 5月9日現在、予察灯への誘殺は確認されていない。

イ 5月9日現在、県東部の早期田植ほ場(4月下旬植)への侵入は確認されているが、被害は軽微である。

ウ 5月9日現在の越冬世代成虫の飛翔活動に必要な有効積算温量、及び向こう1か月の気象予報から、本種の水田への侵入盛期は、平坦地及び中間地では平年並、山間地ではやや遅いと見込まれる。

エ 前年の第1世代成虫の発生量はやや少なかった。

##### (3) 防除上注意すべき事項

ア 育苗箱施用剤の防除効果が高いので、使用時期及び使用量を守って1箱ずつ均一に薬剤を散布する。使用薬剤については病害虫防除指針等を参考にする。

イ 育苗箱施用剤による防除を行っていても本田での食害が急増する場合には、病害虫防除指針等を参考にして、追加防除を行う。

ウ 直播栽培などの育苗箱施用剤を使用していない水田において、被害葉が顕著に増加し、成虫密度が1株当たり0.5頭以上になった場合は、病害虫防除指針等を参考にして、粒剤などで防除を行う。

## 果 樹

### [ナ シ]

#### 1 黒斑病

##### (1) 予報の内容

発生時期	平年並
発生量	平年並

##### (2) 予報の根拠

ア 県予察ほ場における開花期以降の孢子飛散数は平年を下回った。

イ ナシ園における越冬菌密度調査の結果によると、短果枝の病芽率は平年と比べてやや高く、一年枝上の枝病斑数および病枝率はほぼ平年並であった。

ウ 向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

##### (3) 防除上注意すべき事項

ア 今後、気温の上昇とともに孢子飛散数の増加が予想されるため、出来るだけ早く小袋掛け作業を終了する。特に、降雨直後は孢子飛散数が増加するため、薬剤防除を徹底する。

イ 薬剤は、小袋掛け直前にユニックス顆粒水和剤47の1,500倍液、有機銅水和剤(キノンドーフロアブル又はドキリンフロアブル)1,000倍とポリオキシNAL水和剤1,500倍の混用液、ポリベリン水和剤1,500倍液など、小袋掛け終了後にはジアリン水和剤600倍液などを散布する。

#### 2 黒星病

##### (1) 予報の内容

発生時期	平年並
発生量	平年並

(2) 予報の根拠

ア 5月上旬現在、一部のナシ園で葉や幼果の発病が認められている。

イ 県予察ほ場における開花期以降の果そう基部病斑からの分生子の飛散数は平年を下回った。

ウ これまでの気象経過及び向こう1か月の気象予報から、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病した幼果や葉は取り除き、園外に持ち出し処分する。

イ 薬剤は、ユニックス顆粒水和剤47の2,000倍液、チウラム水和剤(トレノックスフロアブル又はチオノックフロアブル)500倍液、有機銅水和剤(キノンドーフロアブル又はドキラインフロアブル)1,000倍液、アントラコール顆粒水和剤500倍液、ベルコートフロアブル1,500倍液などを散布する。

3 クワコナカイガラムシ

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 前年度、本害虫による果実被害はやや多かった。

イ 越冬卵のふ化開始は、平年より2日遅い5月4日(平年:5月2日)に認められた。

ウ 今後の気象経過などから、ふ化最盛期はほぼ平年並の5月8日前後(平年:5月6日)と見込まれる。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 前年、被害の多かった園や多発園では5~7日間隔で、次の時期に2回の防除を行う。

・幼虫ふ化最盛期 5月 8~12日

・幼虫ふ化終期 5月 13~17日

少発園では5月12日前後に1回防除を行う。

イ 薬剤はスプラサイド水和剤1,500倍液又はアプロード水和剤1,000倍液などを使用する。

ウ 越冬世代は、第1世代及び第2世代よりふ化時期が揃いやすいので防除を徹底する。

エ 薬剤の散布にあたっては、クワコナカイガラムシが集合する枝葉の他、枝の切り口及び粗皮下などにも薬液が十分かかるようにする。

4 ハダニ類

(1) 予報の内容

発生時期 やや遅い

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア クワオオハダニの越冬卵のふ化初日は、平年より5日遅い4月22日(平年:4月17日)であった。

イ 5月上旬現在、県予察ほ場におけるハダニ類の発生量は平年並となっている。

(3) 防除上注意すべき事項

ア ハダニ類の発生が多い園では、カネマイトフロアブル1,500倍液などを散布する。

## 5 アブラムシ類

### (1) 予報の内容

発生時期 やや遅い  
発生量 平年並

### (2) 予報の根拠

ア 5月第1半旬現在、県予察ほ場におけるワタアブラムシの寄生新梢率は0%（平年：12.1%）で、発生時期はやや遅く、発生量はやや少ない。

イ 向こう1か月の気象予報から、ワタアブラムシの第1回目の発生盛期は平年よりやや遅い5月下旬頃（平年：5月第2,3半旬）と見込まれる。

### (3) 防除上注意すべき事項

ア アブラムシ類の発生が多く認められるナシ園では、アドマイヤーフロアブル5,000倍液またはウララDF4,000倍液などを散布する。

イ アドマイヤーフロアブルなどのネオニコチノイド系殺虫剤の使用にあたっては、連用による薬剤抵抗性の発達を避けるため、最小限の使用とする。

## [ 果樹全般 ]

### 1 カメムシ類

#### (1) 予報の内容

発生時期 平年並  
発生量 やや多い

#### (2) 予報の根拠

ア 5月第1半旬現在、県予察ほ場（北栄町）における予察灯の誘殺数はチャバネアオカメムシでやや多く、クサギカメムシでやや少ない。また、集合フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシの誘殺数はやや少ない。

イ ナシ園ではクサギカメムシを中心に発生がやや多く、一部では幼果の被害も確認されている。

ウ 向こう1か月の気象予報から、カメムシ類の発生時期は、ほぼ平年並と予想される。

#### (3) 防除上注意すべき事項

ア カメムシ類の発生が認められる園では、ジノテフラン水溶剤（アルバリン又はスタークル顆粒水溶剤）2,000倍液などを散布する。

## 野菜

### [ スイカ ]

#### 1 菌核病

##### (1) 予報の内容

発生時期 平年並  
発生量 平年並

##### (2) 予報の根拠

ア 5月上旬現在、現地調査ほ場における発生量は平年並である。

イ 本病はやや低温（15～20℃）で、降雨が続くと発生が多くなる。向こう1か月の気象予報によると、発生量は平年並と予想される。

##### (3) 防除上注意すべき事項

ア ハウスやトンネル内が過湿にならないよう適度に換気を行う。咲き終わった花弁は早く摘み取って除去する。

イ 薬剤は、ベルコート水和剤1,000倍液、カンタスドライフロアブル1,500倍液、ロブラール水和剤1,000倍液などを散布する。

ウ 曇雨天が続く場合は、ハウスではスミレックスくん煙顆粒 6 g / 1 0 0 m<sup>3</sup>  
(床面積 5 0 m<sup>2</sup> × 高さ 2 m)、ロブラールくん煙剤  
1 0 0 g / 3 0 0 ~ 4 0 0 m<sup>3</sup> (高さ 2 m、床面積 1 5 0 ~ 2 0 0 m<sup>2</sup>) などを使用する。

## 2 つる枯病

### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

### (2) 予報の根拠

ア 5月上旬現在、現地調査ほ場において、本病の発生は認められていない。

イ 本病は降雨や過湿によって発病が増加するが、向こう1か月の気象予報によると、発生量は平年並と予想される。

### (3) 防除上注意すべき事項

ア ハウスやトンネル内が過湿にならないよう、換気を行う。トンネル栽培のスイカでは、茎葉に雨がなるべくあたらないようにトンネルを開閉する。

イ 本病は、株元や雨滴のあたる箇所から発病しやすいので、薬剤散布は株元にも薬液が付着するように丁寧に行う。

ウ 薬剤は、マンゼブ水和剤(ペンコゼブフロアブル又はジマンダイセン水和剤) 6 0 0 倍液、アントラコール顆粒水和剤 6 0 0 倍液、ダコニール 1 0 0 0 の 1, 0 0 0 倍液などを散布する。

## 3 うどんこ病

### (1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

### (2) 予報の根拠

ア 5月上旬現在、現地調査ほ場において、本病の発生は認められていない。

イ 本病は、25 前後の気温と適度な湿度で発病が増加するが、向こう1か月の気象予報によると、発生量は平年並と予想される。

### (3) 防除上注意すべき事項

ア 本病は、収穫期の草勢低下により発生が多くなるので、初期防除を徹底する。

イ 発生前には、ベルコート水和剤 1, 0 0 0 倍液などを散布する。

ウ すでに発病のみられるほ場では、トリフミン水和剤 5, 0 0 0 倍液などを散布する。

エ つる枯病が同時に発生している場合には、ポリベリン水和剤 1, 0 0 0 倍液などを散布する。

## [スイカ、メロン]

### 1 アブラムシ類

#### (1) 予報の内容

発生時期 やや遅い

発生量 平年並

#### (2) 予報の根拠

ア 5月上旬現在、県予察ほ場(東伯郡北栄町)における有翅アブラムシ類の黄色水盤への飛来量はやや少ない。また、現地調査ほ場におけるワタアブラムシの発生量は平年と比べてやや少ない。

イ 向こう1か月の気象予報によると、発生時期はやや遅く、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア ハウスの換気部分や出入口には寒冷紗被覆を行い、アブラムシ類の侵入防止に努める。

イ 発生初期の防除に努める。スイカのハウス栽培では、着果後にウララDF 2,000倍液などを散布し、その後発生した場合にはアドマイヤー水和剤 2,000倍液などを散布する。

ウ スイカのトンネル栽培では、ツル引き誘引時期にチェス顆粒水和剤 5,000倍液、交配前にバリアード顆粒水和剤 4,000倍液、着果後にウララDF 2,000倍液などを散布する。

エ メロンでは、チェス顆粒水和剤 5,000倍液、バリアード顆粒水和剤 4,000倍液、ウララDF 2,000倍液などを散布する。

2 ハダニ類

(1) 予報の内容

発生時期 やや早い

発生量 やや多い

(2) 予報の根拠

ア 5月上旬現在、現地調査ほ場（ハウス栽培スイカ）におけるハダニ類の発生はやや多い。

イ 向こう1か月の気象予報によると、発生時期はやや早く、発生量はやや多いと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

スイカ、メロンともに、発生初期にバロックフロアブル 2,000倍液を散布する。その後発生が見られた場合はマイトコーネフロアブル 1,000倍液、ダニサラバフロアブル 1,000倍液などを散布し、多発した場合にはコロマイト乳剤 1,000倍液を散布する。

[シバ]

1 葉腐病（ラージパッチ）

(1) 予報の内容

発生時期 平年並

発生量 平年並

(2) 予報の根拠

ア 5月上旬現在、現地生産芝ほ場での本病の発生量は平年並である。

イ 本病は降雨によって発病が増加するが、向こう1か月の気象予報によると、発生量は平年並と予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 本病の発生前にセレンターフ顆粒水和剤 0.5 g/m<sup>2</sup>を 0.1 ~ 0.5 L/m<sup>2</sup>散布する。

イ すでにパッチがみられる場合は、発病部位を中心にグランサー水和剤 500倍液 0.5 L/m<sup>2</sup>、バリダシン液剤 5の500倍液 0.5 ~ 1 L/m<sup>2</sup>などをスポット散布する。