

平成 22 年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：果樹全般・カメムシ類（No. 1）

平成 22 年 5 月 25 日
鳥取県病害虫防除所

表 1 - 1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	0	0.5	-	-	0	0.1	0	0.4
5・上	20	102.0	0	2.5	11	0.9	2	52.4
・中	101	72.3	19	8.1	33	0.7	54	11.3
・下		126.9		44.7		2.1		30.7
6・上		17.0		10.7		1.4		4.3
・中		132.9		25.0		6.7		30.6
・下		141.4		63.2		9.7		38.7

*平年：H12～21

表 1 - 2 集合フェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町				北栄町	
	*		*		本年	平年***
	本年	平年**	本年	平年**		
4月計	1	4.4	0	0.2	4	13.3
5・上	52	33.4	17	15.3	49	25.4
・中	23	22.9	21	11.7	40	9.0
・下		24.3				19.2
6・上		12.2				14.8
・中		33.5				16.8
・下		48.4				12.7

* ... はヒノキ林内、 は と果樹園との中間点の水田畦畔に設置

** ...平年値：H12～21

*** ...平年値：H15～21 年の平均値

表 2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町		鳥取市河原町		湯梨浜町		北栄町	
	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
4月計	1	0.7	-	-	0	0.2	0	0.0
5・上	2	4.8	5	4.6	0	0.1	0	0.5
・中	2	2.3	15	3.0	0	0.0	0	0.3
・下		13.8		26.2		0.0		0.7
6・上		1.8		1.2		0.0		0.1
・中		12.5		2.0		0.1		0.4
・下		12.4		6.6		0.3		2.0

*平年：H12～21

< 情報の内容 5月中旬現在 >

- (1) チャバネアオカメムシは、予察灯の誘殺数が平年と比較して湯梨浜町で多く、八頭町、鳥取市及び北栄町でやや多い(表 1 - 1)。また、集合フェロモントラップの誘殺数は、平年と比較して北栄町で多く、八頭町でやや多い(表 1 - 2)。
- (2) クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、平年と比較して鳥取市でやや多く、八頭町、湯梨浜町及び北栄町で平年並～やや少ない(表 2)。
- (3) チャバネアオカメムシを中心にカメムシ類の誘殺数がやや多くなっている。特にナシでは、袋掛け作業が遅れないようにする。