

平成 2 2 年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病（No. 3）

平成 2 2 年 7 月 2 6 日
 鳥取県病害虫防除所

表 1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況（平成 2 2 年）

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	2.3	0.9	2.1	6.5	4.7	11.6		28.8	22.0
鳥取市 2	0	—	—	3.7	—	—		—	—
鳥取市 3	0	0	0.7	2.3	1.1	3.3		1.1	4.7
鳥取市 4	4.3	0.8	1.2	13.0	7.4	6.6		12.7	8.9
八頭町	0.6	0	0.7	0	1.2	3.5		2.8	5.0
湯梨浜町 1	0.8	0	0.4	1.0	0.4	1.7		0.8	1.6
湯梨浜町 2	4.3	0	—	1.1	0	—		0.7	—
倉吉市	1.3	0.4	0.5	0	0.8	1.1		1.1	2.0
園 試	2.4	0.4	1.0	5.1	4.3	5.1		10.9	11.9
琴浦町 1	7.6	1.6	0.9	9.7	4.8	4.3		26.5	12.9
琴浦町 2	0.7	0	0.4	0.4	0.4	1.1		3.2	2.9
大山町 1	0.4	0	0.2	4.3	1.4	1.5		3.5	3.6
大山町 2	0	0.4	0.7	0.4	1.6	2.6		1.4	5.4
南部町	0	0	0.5	0.4	0.4	0.8		1.1	4.2
平 均	1.8	0.3	0.8	3.4	2.2	3.6		7.3	7.1

平年...平成 1 2 ～ 2 1 年の平均値

1 園当たり 1 0 新梢について、全葉数及び病葉数を調査

< 要約 >

7 月 2 0、2 1 日における新梢葉の平均発病率は 3 . 4 %（平年：3 . 6 %）で、平年並であった。

表 2 ナシ黒斑病の果実における発病率（平成 22 年）

地 区	ポリ袋検定法による			被 袋 果 実 の 発 病 率 ² (%)					
	幼果の発病率 ¹ (%)			6 月			7 月		
	本 年	前 年	平 年 ³	本 年	前 年	平 年 ³	本 年	前 年	平 年 ³
鳥取市 1	3.9	12.0	4.0	0	6.7	3.9	3.3	18.3	7.0
鳥取市 2	0	—	—	0	—	—	1.7	—	—
鳥取市 3	0	2.0	1.1	0	0	1.5	1.7	0	2.0
鳥取市 4	0.6	2.9	1.6	6.7	0	1.6	13.3	15.0	4.7
八頭町	—	1.0	2.1	1.7	0	2.1	0	0	3.9
湯梨浜町 1	0	1.0	1.0	0	0	0	0	1.7	0.5
湯梨浜町 2	0	2.0	—	0	0	—	0	0	—
倉吉市	0	2.0	3.3	0	1.7	1.7	0	3.3	1.9
園 試	0	5.0	3.9	5.0	0	1.2	13.3	5.0	8.8
琴浦町 1	1.1	3.7	2.3	3.3	3.3	1.7	18.3	18.3	13.7
琴浦町 2	0.4	0.9	0.9	0	0	0.6	0	1.7	1.7
大山町 1	2.4	0	0.7	0	0	0.4	0	1.7	1.8
大山町 2	0	0	1.3	0	1.7	0.9	0	0	4.1
南部町	0	0.9	0.7	0	0	0.3	0	0	2.3
平 均	0.6	2.6	1.9	1.2	1.0	1.4	3.7	5.0	4.4

(注)

¹ 1園当り128～254果について調査(試料採取：5月3、4、10日、23 下、3日間
静置後に発病率調査)² 1園当たり60果について除袋調査³ 平年：平成12～21年の平均値

<要約>

7月20、21日における被袋果実の平均発病率は3.7%（平年：4.4%）で、平年並であった。