

平成 2 2 年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ黒斑病（No. 4）

平成 2 2 年 9 月 2 2 日
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成22年)

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	2.3	0.9	2.1	6.5	4.7	11.6	13.1	28.8	22.0
鳥取市 2	0	—	—	3.7	—	—	1.7	—	—
鳥取市 3	0	0	0.7	2.3	1.1	3.3	0.4	1.1	4.7
鳥取市 4	4.3	0.8	1.2	13.0	7.4	6.6	2.0	12.7	8.9
八頭町	0.6	0	0.7	0	1.2	3.5	0	2.8	5.0
湯梨浜町 1	0.8	0	0.4	1.0	0.4	1.7	0	0.8	1.6
湯梨浜町 2	4.3	0	—	1.1	0	—	0.8	0.7	—
倉吉市	1.3	0.4	0.5	0	0.8	1.1	0	1.1	2.0
園 試	2.4	0.4	1.0	5.1	4.3	5.1	13.9	10.9	11.9
琴浦町 1	7.6	1.6	0.9	9.7	4.8	4.3	18.5	26.5	12.9
琴浦町 2	0.7	0	0.4	0.4	0.4	1.1	0	3.2	2.9
大山町 1	0.4	0	0.2	4.3	1.4	1.5	4.4	3.5	3.6
大山町 2	0	0.4	0.7	0.4	1.6	2.6	0.3	1.4	5.4
南部町	0	0	0.5	0.4	0.4	0.8	0.3	1.1	4.2
平 均	1.8	0.3	0.8	3.4	2.2	3.6	4.0	7.3	7.1

平年...平成 1 2 年～平成 2 1 年

1 園当たり 1 0 新梢について全葉数及び病葉数を調査

< 要約 >

9 月 1 6、1 7 日における新梢葉の平均発病率は 4 . 0 %（平年：7 . 1 %）であり、平年を下回った。