

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.7)

令和6年7月18日
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年	本年	前年	本年	平年*
4月計	3	0.8	19	0	7	2.2
5月計	594	20.1	811	37.0	1614	113.8
6・上	140	13.6	欠測	21.8	40	48.2
・中	1022	30.5	1199	33.2	400	38.9
・下	1013	134.5	2698	93.2	706	146.8
7・上	2816	165.3	4596	29.8	2233	149.8
・中		67.7		12.7		78.5
・下		116.0		40.3		94.4

*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

**八頭町はR3年度から調査地点を変更。

***湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年	本年	前年	本年	平年*
4月計	0	0	1	0	0	0
5月計	12	1.0	9	3.0	7	2.6
6・上	2	1.9	欠測	0	1	0.5
・中	82	7.0	115	3.5	83	2.0
・下	159	30.1	261	8.9	138	7.5
7・上	1348	56.6	1410	21.8	789	16.0
・中		56.7		15.5		18.1
・下		147.6		61.4		46.3

*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

**八頭町はR3年度から調査地点を変更。

***湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町**		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	平年	本年	前年	本年	平年*
4月計	0	0.5	0	0	6	0.1
5月計	70	0.9	112	3.0	316	50.8
6・上	52	2.0	欠測	3.6	268	38.0
・中	965	6.9	2010	0.9	4469	61.3
・下	1875	11.6	4455	2.9	4861	119.3
7・上	1611	11.0	6840	3.9	2674	122.8
・中		17.7		3.0		59.9
・下		16.6		2.8		97.2

*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

**八頭町はR3年度から調査地点を変更。

***湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表2 集合フェロモントラップ*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	河原町****		北栄町		米子市*****		南部町	
	本年	前年	本年	平年**	本年	前年	本年	平年***
4月計	9	1.0	18	11.9	1	0	0	0.3
5月計	531	48.0	348	79.2	1	0	0	0.2
6・上	682	10.9	93	23.0	0	0	0	0.3
・中	3686	22.1	89	9.8	1	0	0	0.3
・下	1760	13.5	135	29.8	0	1	0	0.3
7・上	3148	4.5	533	40.0	11	0	3	1.2
・中		1		24.8		0		0.3
・下		0		22.2		0		0.4

* 河原町（水盤式）は果樹園横、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。南部町（乾式）は会見に設置（西部普及所調査）。

** 平年：北栄町：H26～R5、南部町：H29～R5

**** R5年度から郡家町花原の調査地点を河原町小倉に変更。***** R5年から設置地点を変更。

< 1 情報の内容 7月上旬現在 >

- （1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、北栄町、南部町で平年に比べて多く、河原町、米子市で前年に比べて多い。
- （2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。
- （3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。