

# 病虫害発生予察指導情報

## (果樹全般・果樹カメムシ類 No.8)

令和6年7月25日  
鳥取県病虫害防除所

表1－1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 八頭町** |       | 湯梨浜町*** |      | 北栄町  |       |
|-----|-------|-------|---------|------|------|-------|
|     | 本年    | 平年    | 本年      | 前年   | 本年   | 平年*   |
| 4月計 | 3     | 0.8   | 19      | 0    | 7    | 2.2   |
| 5月計 | 594   | 20.1  | 811     | 37.0 | 1614 | 113.8 |
| 6・上 | 140   | 13.6  | 欠測      | 21.8 | 40   | 48.2  |
| ・中  | 1022  | 30.5  | 1199    | 33.2 | 400  | 38.9  |
| ・下  | 1013  | 134.5 | 2698    | 93.2 | 706  | 146.8 |
| 7・上 | 4107  | 165.3 | 4596    | 29.8 | 2233 | 149.8 |
| ・中  | 2321  | 67.7  | 1463    | 12.7 | 1583 | 78.5  |
| ・下  |       | 116.0 |         | 40.3 |      | 94.4  |

\*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

\*\*八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\*湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1－2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 八頭町** |       | 湯梨浜町*** |      | 北栄町 |      |
|-----|-------|-------|---------|------|-----|------|
|     | 本年    | 平年    | 本年      | 前年   | 本年  | 平年*  |
| 4月計 | 0     | 0     | 1       | 0    | 0   | 0    |
| 5月計 | 12    | 1.0   | 9       | 3.0  | 7   | 2.6  |
| 6・上 | 2     | 1.9   | 欠測      | 0    | 1   | 0.5  |
| ・中  | 82    | 7.0   | 115     | 3.5  | 83  | 2.0  |
| ・下  | 159   | 30.1  | 261     | 8.9  | 138 | 7.5  |
| 7・上 | 1348  | 56.6  | 1410    | 21.8 | 789 | 16.0 |
| ・中  | 1813  | 56.7  | 730     | 15.5 | 983 | 18.1 |
| ・下  |       | 147.6 |         | 61.4 |     | 46.3 |

\*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

\*\*八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\*湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表1－3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 八頭町** |      | 湯梨浜町*** |     | 北栄町  |       |
|-----|-------|------|---------|-----|------|-------|
|     | 本年    | 平年   | 本年      | 前年  | 本年   | 平年*   |
| 4月計 | 0     | 0.5  | 0       | 0   | 6    | 0.1   |
| 5月計 | 70    | 0.9  | 112     | 3.0 | 316  | 50.8  |
| 6・上 | 52    | 2.0  | 欠測      | 3.6 | 268  | 38.0  |
| ・中  | 965   | 6.9  | 2010    | 0.9 | 4469 | 61.3  |
| ・下  | 1875  | 11.6 | 4455    | 2.9 | 4861 | 119.3 |
| 7・上 | 1611  | 11.0 | 6840    | 3.9 | 2674 | 122.8 |
| ・中  | 2320  | 17.7 | 2778    | 3.0 | 2354 | 59.9  |
| ・下  |       | 16.6 |         | 2.8 |      | 97.2  |

\*平年：北栄町：H26～R5 八頭町 R3～R5

\*\*八頭町はR3年度から調査地点を変更。

\*\*\*湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

表2 集合フェロモントラップ\*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

| 月・旬 | 河原町**** |      | 北栄町 |      | 米子市***** |    | 南部町 |       |
|-----|---------|------|-----|------|----------|----|-----|-------|
|     | 本年      | 前年   | 本年  | 平年** | 本年       | 前年 | 本年  | 平年*** |
| 4月計 | 9       | 1.0  | 18  | 11.9 | 1        | 0  | 0   | 0.3   |
| 5月計 | 531     | 48.0 | 348 | 79.2 | 1        | 0  | 0   | 0.2   |
| 6・上 | 682     | 10.9 | 93  | 23.0 | 0        | 0  | 0   | 0.3   |
| ・中  | 3686    | 22.1 | 89  | 9.8  | 1        | 0  | 0   | 0.3   |
| ・下  | 1760    | 13.5 | 135 | 29.8 | 0        | 1  | 0   | 0.3   |
| 7・上 | 10149   | 4.5  | 533 | 40.0 | 11       | 0  | 3   | 1.2   |
| ・中  | 6385    | 1    | 497 | 24.8 | 20       | 0  | 4   | 0.3   |
| ・下  |         | 0    |     | 22.2 |          | 0  |     | 0.4   |

\* 河原町（水盤式）は果樹園横、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。  
南部町（乾式）は会見に設置（西部普及所調査）。

\*\* 平年：北栄町：H26～R5、南部町：H29～R5

\*\*\*\* R5年度から郡家町花原の調査地点を河原町小倉に変更。\*\*\*\*\* R5年から設置地点を変更。

## < 1 情報の内容 7月中旬現在 >

- (1) チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、北栄町、南部町で平年に比べて多く、河原町、米子市で前年に比べて多い。
- (2) クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。
- (3) ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年に比べて多く、湯梨浜町で前年に比べて多い。