

チャノキイロアザミウマのフェロモントラップ調査結果(ブドウ、園試砂丘地研究センター調査)

鳥取県病虫害防除所
令和8年9月下旬現在




図2 黄色粘着板におけるチャノキイロアザミウマの誘殺消長

【チャノキイロアザミウマ（砂丘研露地）】

月 旬	4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	2	1	2	3	3	3	0			
平年(H27-R6)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	1.4	4.6	10.6	14.6	40.7	37.8	46.5	34.3	27.4	23.8	6.6	0.4	0.3

【チャノキイロアザミウマ（砂丘研無加温）】

月 旬	4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
平年(H27-R6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.7	0.9	1.4	7.8	34.5	182.7	125.1	101.2	110.1	87.7	52.1	22.9	4.3	1.0	0.0