

病虫害発生予察指導情報

(果樹全般・果樹カメムシ類 No.5)

令和7年6月24日
鳥取県病虫害防除所

表1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町***			湯梨浜町****		北栄町		
	本年	平年1*	平年2**	本年	前年*****	本年	平年1*	平年2**
4月計	0	1.4	0.8	0	19.0	0	2.9	2.4
5・上	0	8.3	3.9	6	261.6	0	57.4	4.6
・中	16	27.3	7.0	45	506.4	6	80.3	64.5
・下	0	127.9	9.2	5	43.0	7	123.8	42.1
6・上	9	45.2	13.6	11	—	4	45.9	46.6
・中	19	278.3	30.5	15	1199.0	13	77.7	41.9
・下		354.1	134.5		2698.0		208.3	153.0

*平年1：北栄町：H27～R6 八頭町 R3～R6

** 平年2（R6を除く）：北栄町：H27～R5 八頭町：R3～R5

***八頭町はR3年度から調査地点を変更。

****湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

*****調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

表1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町***			湯梨浜町****		北栄町		
	本年	平年1*	平年2**	本年	前年*****	本年	平年1*	平年2**
4月計	0	0.0	0.0	0	1.0	0	0.0	0.0
5・上	0	0.1	0.0	0	1.7	0	0.3	0.2
・中	0	0.7	0.0	0	7.3	0	1.5	1.5
・下	0	3.0	1.0	2	0.0	3	1.3	0.9
6・上	1	1.9	1.9	0	—	1	0.4	0.4
・中	0	25.8	7.0	6	115.0	6	10.2	2.1
・下		108.6	30.1		261.0		21.2	8.2

*平年1：北栄町：H27～R6 八頭町 R3～R6

** 平年2（R6を除く）：北栄町：H27～R5 八頭町：R3～R5

***八頭町はR3年度から調査地点を変更。

****湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

*****調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

表1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数(頭)

月・旬	八頭町**			湯梨浜町***		北栄町		
	本年	平年1*	平年2**	本年	前年*****	本年	平年1*	平年2**
4月計	0	0.4	0.5	0	0	0	0.7	0.1
5・上	0	0.4	0.3	0	9.0	0	6.6	1.6
・中	0	2.3	0.3	4	62.0	10	23.7	16.5
・下	0	15.4	0.4	0	41.0	1	49.9	35.9
6・上	0	14.5	2.0	1	—	5	58.7	35.5
・中	0	246.3	6.9	6	2010.0	9	506.0	65.6
・下		477.5	11.6		4455.0		599.0	125.4

*平年1：北栄町：H27～R6 八頭町 R3～R6

** 平年2（R6を除く）：北栄町：H27～R5 八頭町：R3～R5

***八頭町はR3年度から調査地点を変更。

****湯梨浜町はR5年度から調査地点を変更。

*****調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

表2 集合フェロモントラップ*におけるチャバネアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	河原町****		北栄町			米子市*****		南部町*****	
	本年	前年*****	本年	平年1**	平年2***	本年	前年	本年	前年
4月計	6	9.0	26	13.7	13.2	1	—	3	—
5・上	20	8.0	44	41.3	33.9	0	—	0	—
・中	84	142.0	26	33.3	30.8	4	—	0	—
・下	11	381.0	2	34.4	17.8	0	—	0	—
6・上	65	682.0	21	28.1	20.9	1	—	0	—
・中	66	3686.0	2	16.9	8.9	6	—	1	—
・下		1760.0		40.9	30.4		—		—

* 河原町（水盤式）は果樹園横、北栄町（水盤式）は果樹園横、米子市（乾式）は別所に設置。南部町（乾式）は金田に設置（西部普及所調査）。

** 平年1：北栄町：H27～R6

*** 平年2（R6を除く）：北栄町：H27～R5

**** R5年度から郡家町花原の調査地点を河原町小倉に変更。

***** R7年度から米子市別所地区内で調査地点を変更。

R7年度から南部町会見地区の調査地点を南部町金田地区に変更。

*****調査地点変更後3年未満のため、前年値を記載。

< 1 情報の内容 6月中旬現在 >

（1）チャバネアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町、北栄町で平年並。湯梨浜町で前年に比べて少ない。また、集合フェロモントラップにおける誘殺数は、北栄町で平年に比べてやや少ない。河原町で前年に比べて少ない。

（2）クサギカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町で平年に比べて少なく、北栄町で平年に比べてやや多い。湯梨浜町で前年に比べて少ない。

（3）ツヤアオカメムシの予察灯における誘殺数は、八頭町で平年に比べて少なく、北栄町で平年に比べてやや少ない。湯梨浜町で前年に比べて少ない。