

出穂した時期別の収穫適期予測について（令和7年9月15日現在）

収穫適期の予測を行いますので、適期収穫を目指した収穫作業計画の参考として活用してください。

【情報を活用する上での注意点】

○高温年での収穫適期は、出穂後の日平均気温積算値を基に予測しており、ひとめぼれ 910～1110℃、コシヒカリ 890～1140℃となる月日です（R5年度水稻・大豆・小豆栽培指導指針）。星空舞は、標高300m未満の地域で1000～1260℃（有効積算気温620～770℃）、標高300m以上の地域で920～1170℃（有効積算気温510～620℃）となる月日です（R5年版「星空舞」栽培手帳）。

○アメダスの実測値及び1ヶ月予報値を基に各1kmメッシュの日平均気温を推定し、積算気温により収穫時期を予測しています。

○収穫適期予測に必要な気象データは、農研機構と㈱ライフビジネスウェザーが共同開発し、㈱ライフビジネスウェザーが提供するメッシュ農業気象システムの気象データを用いています。

○あくまでも目安であり、地形、かんがい水温などのほ場条件、水管理、施肥などの栽培条件等によっては誤差がでることがあります。

○収穫適期を予測したいほ場の標高は、地図などで検索してください。

【現時点での状況】

今年の平均気温は、平年値（直近30年平均）より7月が+3.8℃、
向こう1か月の予測値が+2.7℃となっており、高温年に該当します。

特に早生品種の刈り遅れに注意し、玄米品質の低下を防ぎましょう。

ひとめぼれ予測収穫適期

（月/日）

標高	出穂期（ほ場の約50%が出穂した日）				
	7/20	7/25	7/30	8/5	8/10
0～49m	8/20 ～ 8/27	8/25 ～ 9/2	8/31 ～ 9/7	9/6 ～ 9/13	9/11 ～ 9/19
50～99m	8/21 ～ 8/28	8/26 ～ 9/2	8/31 ～ 9/8	9/7 ～ 9/14	9/12 ～ 9/20
100～149m	8/21 ～ 8/29	8/27 ～ 9/3	9/1 ～ 9/8	9/7 ～ 9/15	9/12 ～ 9/20
150～199m	8/22 ～ 8/29	8/27 ～ 9/3	9/1 ～ 9/9	9/8 ～ 9/16	9/13 ～ 9/21
200～249m	8/22 ～ 8/30	8/27 ～ 9/4	9/2 ～ 9/10	9/8 ～ 9/16	9/13 ～ 9/22
250～299m	8/23 ～ 8/30	8/28 ～ 9/5	9/2 ～ 9/10	9/9 ～ 9/17	9/14 ～ 9/22
300～349m	8/23 ～ 8/31	8/28 ～ 9/5	9/2 ～ 9/11	9/9 ～ 9/17	9/14 ～ 9/23
350～399m	8/23 ～ 8/31	8/29 ～ 9/6	9/3 ～ 9/11	9/10 ～ 9/18	9/15 ～ 9/24

コシヒカリ予測収穫適期

（月/日）

標高	出穂期（ほ場の約50%が出穂した日）				
	7/25	7/30	8/5	8/10	8/15
0～49m	8/25 ～ 9/3	8/30 ～ 9/8	9/5 ～ 9/15	9/10 ～ 9/20	9/15 ～ 9/26
50～99m	8/25 ～ 9/3	8/31 ～ 9/9	9/6 ～ 9/15	9/11 ～ 9/21	9/16 ～ 9/27
100～149m	8/26 ～ 9/4	8/31 ～ 9/10	9/6 ～ 9/16	9/12 ～ 9/22	9/17 ～ 9/28
150～199m	8/26 ～ 9/5	8/31 ～ 9/10	9/7 ～ 9/17	9/12 ～ 9/22	9/17 ～ 9/28
200～249m	8/27 ～ 9/5	9/1 ～ 9/11	9/7 ～ 9/17	9/12 ～ 9/23	9/18 ～ 9/29
250～299m	8/27 ～ 9/6	9/1 ～ 9/11	9/8 ～ 9/18	9/13 ～ 9/24	9/18 ～ 9/30
300～349m	8/27 ～ 9/6	9/2 ～ 9/12	9/8 ～ 9/19	9/13 ～ 9/24	-
350～399m	8/28 ～ 9/7	9/2 ～ 9/12	9/9 ～ 9/19	9/14 ～ 9/25	-

星空舞予測収穫適期

(月/日)


標高	出穂期（ほ場の約50%が出穂した日）				
	7/30	8/5	8/10	8/15	8/20
0～49m	9/2 ～ 9/11	9/8 ～ 9/17	9/13 ～ 9/23	9/19 ～ 9/30	9/25 ～ 10/10
50～99m	9/3 ～ 9/12	9/10 ～ 9/19	9/15 ～ 9/25	9/20 ～ 10/3	9/27 ～ 10/15
100～149m	9/4 ～ 9/13	9/11 ～ 9/21	9/16 ～ 9/27	9/21 ～ 10/6	9/29 ～ 10/20
150～199m	9/4 ～ 9/14	9/11 ～ 9/22	9/16 ～ 9/29	9/22 ～ 10/9	9/30 ～ 10/30
200～249m	9/5 ～ 9/15	9/12 ～ 9/23	9/17 ～ 10/1	9/24 ～ 10/12	-
250～299m	9/6 ～ 9/16	9/13 ～ 9/25	9/18 ～ 10/3	9/25 ～ 10/17	-
300～349m	8/30 ～ 9/7	9/6 ～ 9/14	9/11 ～ 9/19	9/16 ～ 9/26	-
350～399m	8/31 ～ 9/8	9/7 ～ 9/15	9/12 ～ 9/20	9/17 ～ 9/28	-

きぬむすめ予測収穫適期

(月/日)

標高	出穂期（ほ場の約50%が出穂した日）			
	8/10	8/15	8/20	8/25
0～49m	9/10 ～ 9/18	9/15 ～ 9/24	9/21 ～ 9/30	9/27 ～ 10/7
50～99m	9/11 ～ 9/19	9/16 ～ 9/25	9/22 ～ 10/2	9/28 ～ 10/9
100～149m	9/12 ～ 9/20	9/17 ～ 9/26	9/22 ～ 10/2	-
150～199m	9/12 ～ 9/21	9/17 ～ 9/26	9/23 ～ 10/3	-

【参考】鳥取県内における1kmメッシュの平均標高分布図



- 標高 0～100m未満
- : 100～200m未満
- : 200～300m未満
- : 300～400m未満
- : 400～500m未満
- : 500～600m未満
- : 600m以上