

令和8年度 水稻生育状況（農業試験場 作況田）

5月11日移植(4月17日播種)

調査項目		ひとめぼれ			コシヒカリ		
		本年	平年	差・比	本年	平年	差・比
生育ステージ	最高分けつ期	6月25日	6月27日	-2	6月29日	6月28日	+1
	幼穂形成期	6月30日	7月1日	-1	6月30日	7月4日	-4
	出穂期	7月21日	7月24日	-3	7月24日	7月26日	-2
	成熟期	8月24日	8月26日	-2	8月28日	8月28日	0
	成熟期	8月24日	8月26日	-2	8月28日	8月28日	0
苗乾物重(mg/本)	田植時	15.4	15.5	99	15.8	16.4	97
葉 齢 (葉)	田植時	3.2	3.4	-0.2	3.1	3.3	-0.2
	15日後	6.2	5.9	+0.4	5.7	5.7	-0.0
	25日後	8.6	7.6	+1.0	7.9	7.5	+0.4
	35日後	10.1	9.4	+0.7	9.5	9.3	+0.2
	45日後	11.4	10.8	+0.6	10.9	10.6	+0.3
	幼穂形成期	11.8	11.5	+0.3	11.2	11.8	-0.6
	出穂期(止葉葉位)	14.1	13.9	+0.2	13.7	13.6	+0.1
茎 数 (本/㎡)	田植時	57	62	92	57	57	100
	15日後	72	74	97	57	64	88
	25日後	220	183	120	143	155	92
	35日後	377	339	111	269	286	94
	45日後	531	553	96	420	450	93
	幼穂形成期	525	550	95	435	459	93
	出穂期	525	550	95	435	459	93
草 丈 (cm)	田植時	10.4	10.0	103	10.6	11.3	93
	15日後	18.6	19.2	97	18.2	23.1	79
	25日後	25.9	22.5	115	25.4	26.6	95
	35日後	34.8	31.0	112	36.0	32.9	109
	45日後	52.1	49.5	105	49.5	51.6	96
	幼穂形成期	59.4	62.7	95	58.6	69.4	84
	出穂期	59.4	62.7	95	58.6	69.4	84
葉 色 (SPAD値)	田植時	26.9	26.7	+0.3	27.7	25.0	+2.7
	15日後	34.2	29.3	+4.9	31.2	26.6	+4.6
	25日後	40.0	37.8	+2.1	35.6	36.0	-0.4
	35日後	39.5	39.6	-0.1	36.1	38.1	-2.0
	45日後	38.2	38.3	-0.1	40.3	36.9	+3.4
	幼穂形成期	41.1	37.6	+3.5	43.6	34.2	+9.4
	出穂期	36.9	37.1	-0.2	41.1	39.1	+2.0
成熟期形質	稈長(cm)	87.2	88.6	98.4	93.1	93.2	100
	穂長(cm)	20.2	20.0	101	21.1	20.5	103
	倒伏程度	0.5	0.9	-0.4	2.8	1.1	+1.7
	有効穂数(本/㎡)	450	464	97	382	360	106
	有効茎歩合(%)	84.8	82.6	103	87.7	76.9	114

- 注1) 平年値は直近5年間の平均値（四捨五入）。
 2) 令和5年度から全ての品種で調査地点の栽植密度を19.0株/㎡に統一。
 3) 田植時茎数は植付苗数と栽植密度で計算した値

5月25日移植(5月5日播種)

調査項目		コシヒカリ			星空舞			きぬむすめ		
		本年	平年	差・比	本年	平年	差・比	本年	平年	差・比
生育ステージ	最高分けつ期	7月9日	7月7日	+3	7月9日	7月9日	0	7月9日	7月8日	+1
	幼穂形成期	7月13日	7月12日	+1	7月18日	7月19日	-1	7月24日	7月25日	-1
	出穂期	8月3日	8月3日	0	8月8日	8月7日	+1	8月16日	8月15日	+1
	成熟期	9月8日	9月5日	+3	9月15日	9月12日	+3	9月23日	9月22日	+1
	成熟期	9月8日	9月5日	+3	9月15日	9月12日	+3	9月23日	9月22日	+1
苗乾物重(mg/本)	田植時	14.0	16.8	83	12.8	16.2	79	13.4	15.8	85
葉 齢 (葉)	田植時	3.3	3.3	0.0	3.3	3.4	-0.1	3.3	3.2	+0.2
	15日後	6.5	6.1	+0.4	6.5	6.1	+0.4	6.3	5.9	+0.5
	25日後	8.5	8.2	+0.3	8.5	8.3	+0.2	8.4	8.0	+0.4
	35日後	10.0	10.1	-0.1	10.2	10.0	+0.2	9.9	9.9	0.0
	45日後	11.2	11.4	-0.2	11.4	11.4	0.0	11.4	11.3	+0.1
	幼穂形成期	11.7	11.8	-0.1	12.4	12.5	-0.1	12.7	12.8	-0.1
	止葉葉位	14.1	13.9	+0.2	14.8	14.4	+0.4	15.4	15.2	+0.2
茎 数 (本/㎡)	田植時	57	57	100	57	57	100	57	62	92
	15日後	105	75	141	96	80	119	86	87	98
	25日後	257	194	133	248	209	118	240	220	109
	35日後	393	363	108	394	443	89	364	421	86
	45日後	480	414	116	527	493	107	462	498	93
	幼穂形成期	473	405	117	524	482	109	440	446	99
	出穂期	473	405	117	524	482	109	440	446	99
草 丈 (cm)	田植時	12.2	13.6	90	11.7	12.8	91	16.5	13.9	118
	15日後	25.1	24.9	101	23.6	22.3	106	25.9	21.2	122
	25日後	27.8	30.1	92	25.8	27.5	94	27.0	28.3	96
	35日後	47.7	45.6	105	43.3	39.9	108	43.7	42.3	103
	45日後	68.3	65.9	104	57.8	59.5	97	62.4	66.6	94
	幼穂形成期	74.8	71.5	105	72.2	72.8	99	81.4	86.8	94
	出穂期	74.8	71.5	105	72.2	72.8	99	81.4	86.8	94
葉 色 (SPAD値)	田植時	24.3	26.4	-2.1	25.2	26.6	-1.4	26.9	26.6	+0.3
	15日後	35.5	30.3	+5.2	35.1	31.1	+4.0	34.3	31.2	+3.1
	25日後	36.4	36.6	-0.2	36.7	36.6	+0.1	35.6	37.7	-2.1
	35日後	42.5	37.0	+5.5	40.5	37.2	+3.3	40.6	36.8	+3.9
	45日後	42.3	35.1	+7.2	43.7	36.1	+7.6	41.3	36.7	+4.5
	幼穂形成期	36.7	34.3	+2.4	34.4	32.5	+1.9	34.0	30.7	+3.3
	出穂期	35.7	37.4	-1.7	35.1	36.3	-1.2	36.9	36.0	+0.9
成熟期形質	稈長(cm)	95.0	92.8	102	88.0	83.4	105	81.4	85.1	96
	穂長(cm)	19.5	20.1	97	19.0	20.1	95	17.8	18.5	96
	倒伏程度	1.0	1.5	-0.5	0.9	0.4	+0.5	0.0	0.0	0.0
	有効穂数(本/㎡)	397	314	127	423	347	122	390	350	111
	有効茎歩合(%)	82.7	76.8	108	80.3	69.1	116	84.5	71.4	118

- 注1) 平年値は直近5年間の平均値（四捨五入）。
 2) 令和5年度から全ての品種で調査地点の栽植密度を19.0株/㎡に統一。
 3) 田植時茎数は植付苗数と栽植密度で計算した値